

INAUGURALIS MEDICA
DE

MORBIS CUTANEIS

SISTENS

APULAS, SQUAMMAS, VESICULAS ET BULLAS

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE

MAGNIFICI DOMINI PRAESIDIS

ET DIRECTORIS

SPECTABILIS DOMINI DECANI

NEC NON

CLARISSIMORUM DOMINORUM D. PROFESSORUM

PRO

DOCTORIS MEDICINAE LAUREA

SUMMISQUE

IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ALMA, AC CELEBERRIMA

REGIA SCIENTIARUM

UNIVERSITATE PESTIENSI

PUBLICAE DISQUISITIONI

submittit

DAVID ANTAL

Artis Obstetriciae Magister.

Theses adnaexe defenduntur in Palatio Universitatis
majori die Maji 1845.

PESTINI 1845.

Typis Landerer et Heckenast

ORVOSI ÉRTEKEZÉS

A'

BŐRSZENVEKRŐL

KÜLÖNÖSEN

A' BUBORNYÁK, PIKELYEK, HÓLYAG-
CSÁK 'S BUGYOKRÓL.

ORVOSTUDORRÁ

AVATTATÁSA ÜNNEPÉLYÉRE

ÍRTA

ANTAL DÁVID

SZÜLÉSZ-MESTER.

Az értekezéshez mellékelt tételek fölötti vitázás 1845ik Május n
leend.

PESTEN.

Nyomatott Landerer és Heckenastnál.

1845.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1892

100 N. 4TH ST. NEW YORK, N. Y.

1892

1892

1892

1892

1892

1892

1892

1892

1892

A'

LEGJOBB ÉDES-ANYÁNAK

mély fiui tisztelet és hála jeléül

ajánlja

a' szerző.



Digitized by the Internet Archive
in 2015

<https://archive.org/details/b2238909x>

II. Osztály. — Bubornyák (Papulae).

A' bubornyás kütegek ezelőtt száraz rüh nevezet alatt adattak elő, (Felix Plater) Alibert a' viszketegyek közös nevezete alá sorolta; Rayer megkülönbözteti a' mohagot a' viszketegtől 's a' hámlagot gyermekeknél előforduló mohagnak tartja; Biett el nem ismeri a' hámlagot, mint külön nemet, hanem a' mohag fajának tekintti. Willan, kit itt követünk, a' bubornyás kütegek következő három nemét különbözteti meg: u. m. a' hámlagot, mohagot 's a' viszketegget.

Hámlag.

Hámlany. *Strophulus* Willan et Bateman. — *Lichen Strophulus* Biett. Ezen nevezet alatt értünk csupán gyermekeknél előforduló, kiesiny, elszórt vagy csoportos, piros udvarral ellátott vagy a' nélküli, ritkán viszkető bubornyák által jellemzett bőrküteget, mely sokszor újabb kitörésekkel járván, lepikelyezéssel végződik. A' mohagtól az által különbözik, hogy csak a' gyermek-korban fordul elő; azért Rayer azt méltán gyermekeknél előjövő mohag-fajnak veszi.

Willan és Bateman következő hat fajt vesznek föl:

a) Közbefestet h. *Str. intertinctus* W. et B. (Bat. T. 1. Fror. T. 1. f. 1. Behr. T. 14. f. 1.) Kiesiny, vörös udvarral ellátott, közönségesen elszórt bubornyák, bibékkel 's nagy vörös

folttokkal vegyítve. Az arczon, alkaron, kézen, háton leggy krabban, az egész testen ritkán jönnek elő 's három négy hét után lepickelyezéssel végződnek.

b) Fehéres h. *Str. albidus* W. et B. (Bat. T. 2. Fror. T. 1. f. 2. Behr. T. 14. f. 2.) Az előbbenitől a' bibék és folttok hiánya által különbözik.

c) Fehér h. *Str. candidus* W. et B. (Bat. T. 3. f. 3. Fror. T. 1. f. 4. Behr. T. 14. f. 5.) Ha a' bubornyák nagyobbak, fényese 's udvarnélküliek, akkor c' nevezetet nyerik. A' hamlagnak eze faja közönségesen heveny betegségek után mutatkozik.

d) Csoportos h. *S. confertus* W. et B. (Bat. T. 3. f. 3. Fror. T. 1. f. 3. Behr. T. 14. f. 3.) Nagy mennyiségben és csoportosan előforduló, viszkető vörös bubornyákkal jellemzi magát és a' által, hogy többnyire lázas izgatást gerjeszt. Leginkább az arczbőrön fordul elő, 's tizennégy nap mulva lepickelyezéssel enyészik. Ezzel azonban a' baj tökéletesen be nem végződött, mert rendese utókitörések következnek. Közönségesen a' fogzás által okoztatik 's ezek áttörésével ismét elmúlik.

e) Foltos h. *S. volaticus*. — *Olophlyctis volaticus* Alib. — Feu volage des enfans. — (Bat. T. 3. f. 2. Fror. T. 1. f. 4. Behr. T. 14. f. 4.) Kicsiny és körképű folttokon ülő bubornyák, mellyek 3—4 nap mulva megbarnulnak és leporlanak. Többnyire utókitörések (5—6szor egymás után) következnek, minélfogva a' betegség rendesen 4—5 hétig elhúzódik. Will., Bat. és Schönlein szerint ezen faj többnyire a' belek beteges állapotával összefüggésben. Alibert és a' francziák szerint egyedül a' fogak kitörésével van párosulva, melly élettani folyamattal párhuzamosan szokott lefolyni és mellyek bevégeztével eltűnik. Kitétszik ebből hogy az utóbbiak a' csoportos hamlagot ezen néven vették.

f) Levedző, vagy fekélyesülő hamlagnak *S. agrius* neveztetik azon hamlag, melly fekélyedésekkel jár.

Okvizsga. Ezen csak a' gyermeki kort meglepő küteg oka nem elég világosak, közönségesen az emésztésre szolgáló zsigerek bántalmával kezdődik, mint: savanyképléssel, légkifejléssel, székrekedéssel vagy hasmenéssel; csupán a' csoportos és foltos hamlag a' fogak kitörésétől okozott izgatás következelme.

Jóslata mindig kedvezőnek mondható 's csak a' visszavetődés okozhat az egész életműsgre ható bajokat, mint: hasmenést, göresüket, rángásokat.

A' helybeli gyógyítás a' bőrműködés előmozdítására langy fürdők használatában, 's ha a' viszketés nagy, föleresztett boreczetteli mosásokban áll. A' levedző hámlag a' fürdőkön kívül még horgéleg kenősesöt is kíván — gr. 10 oxyd .Zinci ad unc .1. Ungv. pom. — Különben szükséges a' gyermekeket melegen tartani és ha meghűtés által a' kűteg visszaverődött volna, leginkább meleg fürdő által lehet visszahozni, melly után néhány (8—1 c 0) csöp Minderer szesz bodza forrázatban adathatik. A' többi gyógymód a' jelenlévő kórállapot szerint intéztetik; savany képlődésnél katang 's rheum szörp, kesereg rheummal vagy e nélkül; székrekedésnél a' kisdelek mézvíze, manna szörp; emésztési gyöngeségnél Colombo, Péribúj 's könnyű vasszerek. — A' fogak kitörése okozta izgatás ellen gyakori langy mosások, némellykor a' foghús bemetélése szükséges, mi által a fogak kitörése megkönnyebbitetik.

Mohag.

Mohany. Liehen Wil. et Bat. — Prurigo lichenoidea seu furfurans Alib. Ezen nem ragályos baj többnyire ölserdülteknél előforduló, kiterjedt, egyes vagy csoportos, fehér vagy vörös viszkető, rendesen lepikelyezéssel végződő, többször visszajövő bubornyákkal jellemeztetik. Következő fajai ismeretesek:

a) Egyszerű m. L. simplex W. et B. (Behr. T. 14. f. 6. 10) Leginkább a' képen 's karon kezdve gyorsan az egész testre kiterjedő, alkalmatlan, főleg éjjel viszkető, különösen az izületeken bőven előforduló, a' nyári hónapokat kedvelő vörös bubornyákból áll, mellyek 10—21 nap után elhalványodván, lepikelyzenek. Lefolyása heveny vagy idült.

Heveny lefolyása. Előrejárt 1—2 napig tartó lázas és sorvás jelenségek után (az utolsó napon keserű íz, émelygés) az eron és azután az egész testen vörös, nagy, igen viszkető bubornyák tűnnek elő, mellyek kiütésével a' láz megszűnik. Ezen bubornyák lepikelyezéssel néhány(5—8) nap alatt elenyészvén, új 5—6-szor kitörés következik, 's ennek elmúltával a' baj bevégeződik. E'

betegség némelykor kezdő kanyaró vagy köles himlővel összezavarathatik, azonban az alaknak megvizsgálása, a' viszketés 's a' lefolyás ezen tévedéstől megóvnak.

Idült lefolyása. (Bat. T. 4 f. 1. Fror. T. 2. f. 1. Behr. T. 14. f. 7. 9) A' bubornyák kisebbek, vörösségök 's viszketésök csekélyebb, leginkább a' végtagokon fordulnak elő, és miután többször kiütvén 2—3 hónapig eltartottak, szinte lepikelyezéssel végződnek. Ha a' bubornyák egyesén kerülnek elő, elszórt mohagnak (L. sparsus) hivatik; — ha pedig több csoportozatokba összefolynak, és vörös beszűrődött bőr részt mutatnak, mellyen egész sereg bubornyák 's kiesiny ezüstcsillogásu pikelyek látszanak, akkor azon érdekes, de igen makacs alakja tűnik elő, melly elterjedt mohagnak (L. diffusus) neveztetik. A' bőrnek ezen beszűrődése az ebben támadt kiizzadmánynak következelme. Az idült mohag nem ritkán rüh, viszketeg, izzag, fényleg és halaggal föleserélthetvén, következő kórkülönböző jelenségekre szükséges ügyelni:

Mohag.

Bubornyák.

Atkamenet hiányzik.

Erős lepikelyezés.

Gyakori kórismétlet.

Nem ragályos.

Mohag.

Kiesiny, gyakran csoportos és vörös bubornyák.

A' viszketés nem olly nagy.

Semmi mirigydag.

Sokszor heveny lefolyás.

Gyógyítható.

Mohag.

Semmi vagy csekély beszűrődés.

Bubornyák.

Viszkető érzés.

Fehér pikelyek.

Rüh.

Többször hólyagesák.

Atkamenet jelen van.

Kis kérgek képlődése.

Semmi kórismétlet.

Ragályos.

Viszketeg.

Nagyobb, mindenkor egyes és a' bőrrel hason színű bubornyák.

A' viszketés igen nagy.

Mirigydag.

Mindenkor huzamos lefolyás.

Gyógyíthatlan.

Izzag.

Nagy beszűrődés.

Hólyagesák, mellyek bennéke a' fehérenemű ruhában ondóemű foltot képez.

Égető érzés.

Sárgás pikelyek.

Mohag.

A' bőr beszűrődött.

A' pikelyek aprók.

Bubornyak jelen vannak.

Mohag.

A' bőr vastagodása vörösséggel párosult.

A' pikelyek egész felületökkel ülnek a' bőrön.

Folytonos viszketés.

b) Szőr m. *Lich. pilaris* (Fror. T. 2. f. 4.) Csupán az egyszerű mohag módosítása, többnyire a' végtagok feszdoldalán jön elő, 's a' meggátolt szőr vagy haj kitörés által támad, ha tehát illy bubornya felvakartatik, benne egy tekeredett szőrszált találunk, 's a' bubornya eltűnik.

c) Körülírt m. *L. circumscriptus seu figuratus*. *Herpes squamosus orbicularis* Alib. (Bat. T. 5. Alib. f. 26. Fror. T. 2. f. 3.) Az által jellemeztetik, hogy a' bubornyak $\frac{1}{2}$ —1 hüvely átmérőjű, szabálytalan, körídomú 's szorosan körülírt vörös szélekkel ellátott foltokon ülnek. A' foltok szélei új kiütések után tovább terjednek 's összefolynak, míg ez történik a' foltok közepe megszimul, de még kevésbé vörösek maradnak 's pikelyektől fedetnek; mi által a' körkörös fényleggel némi hasonlóságot öltnek. — Ha azonban több illy kütég alakok széleikkel összefolynak, a' tekeresezett mohag támad, melyet szonban Biett tekeresezett mohagától meg kell különböztetnünk — a' tekeresezett mohag *L. gyratus* Biett apró, szalaghoz hason 's szorosan a' singideg lefolyását követő bubornya csoportozatokat képez. — A' körülírt mohag többször tesz utókiütéseket, némellykor kórátteteleket 's kisdedeknél is előjöheth.

d) Levedző v. fekélyesülő m. *L. agrius* W. et B. (Bat. T. 4. Fror. T. 2. f. 2. Behr. T. 14. f. 8.) E' faját a' mohagnak többnyire csorvás 's lázas tünetmények előzik meg, melyek a' kütég megjelenése után eltűnnek; azután erős viszketéstől követett csoportozatokban előjövő bubornyak mutatkoznak, melyek gyakran hólyagosákkal vegyülve nagy vörös foltokat képeznek; 6—8 nap múlva a bőr megérdesedik, pikelyektől fedetik 's mély, igen fájdalmas

Fényleg.

A' bőr nincs beszűrődve.

A' pikelyek nagyok.

Bubornyak nincsenek.

Halag.

Bőrvastagodás vörösség nélkül.

A' pikelyek szélökkel tapadnak a' bőrre.

A' viszketés hiányzik.

bőrrepedések támadnak, ritkán végződik be egyetlen egy kiütéssel. — Mások e' névvel a' vakarás által előhozott bőrrepedék 's fekélyösszeget nevezik, melly minden mohag fajból támadhat.

e) Kékszenyes m. *L. lividus* W. et B. (Fror. T. 2. f. 5.) Csupán a' bubornyák kék szenyes színétől így nevezett faj 's gyakran patéescsal szövetkezik.

f) Hévvonalos m. *L. tropicus*. A' hévvonal alatt előjövő faj; többnyire azon egyéneket lepi meg, kik legelőször a' hévvonal alá jönnek.

g) Csalános m. *L. urticatus* W. et B. Ezt Alibert csupán a' csalánküteg változatának hiszi; eleinte a' poloska csípéshez hasonló foltdagályok mutatkoznak, mellyek 1—2 nap múlva összeesvén, felettök bubornyák képződnek 's kivált éjjel igen viszketnek. Mig az először kijött foltdagályok elmulnak, mások jönnek ki, mellyek ugyanazon lefolyásuak, úgy, hogy némelykor az egész törzsök 's végtagok meg vannak lepve. E' kórkép tehát foltdagályok 's bubornyák által jellemeztek. Gyakorta előjön kisdedeknél, még pedig mindjárt a' születés után. — Ezenkívül megemlítjük még a' helybeli mohagokat, mellyek az arczon, a' végtagok hajtóldalain (álrüh) a' tökborekon. a' gáton (*Pygagria granulata* Fuchs) előjönnek, aranyérrel párosulva aranyeres mohagnak neveztek.

Ok vizsga. A' mohag okairól igen keveset tudunk, a' leggyakoribb kórgerjesztő okokhoz számítatik a' bőrre kültt túlságos hévbehatás, a' léles italokkali visszaélés 's izgató csipős étanyagok használata.

A' jóslat a' kórkiterjedéshez méretik; ha azon fokát éri el a' kifejlődésnek, mellyet elterjedt mohagnak nevezünk, a' jóslat nem az élet veszélyeztetése, hanem a' meg nem gyógyulhatás végett igen kedvezetlen.

G y ó g y m ó d. A' mohag különféle fajai különféle szerelést igényelnek, azonban mindenütt szükség szoros életkormányt 's a' beható kórgerjesztő okok eltávolítását legelőbb rendelnünk. A' heveny mohagnál a' szerelés, a' viszketés 's a' csorvás állapot ellen irányoztatik; azért a' kórkezdetén hánytató, később olvasztó hűsítő szerek, mint: borkő-citrom-sav, felereszteft kénsav, Tamarind-főzet vannak javalva. Az izzasztó szereket, mellyek a' vért a' bőrfelé hajtják, mindig kerülnünk kell. Gyenge testalkotmánynál kina

orrázat vagy főzet ásvány savakkal igen hasznos, helybelileg egy-
 zerű (nem kénes) fürdők használtatnak. A' viszketés ellen korpa,
 iliz, mályva főzetekkel mosások, ha a' viszketés igen nagy higi-
 ott eczet vagy következő keverék: Rp. Aq. Lauroc. dr. 2 — un c.
 emis ad unc. sex Aq. dest. sim. — belsőleg bódár szerek, ki-
 ált keserű mandolákból készült tejet rendeltetik. A' húzamos 's ma-
 aes mohagnál a' pikelyek eltávolítására először egyszerű általános
 fürdő használtassék; ezután helybeli a' bőr kóralakulásait másító sze-
 ek vétessenek használatba, e' tekintetből legnagyobb hírre kapott
 z alhigiblaes (Protojod. Hydr.) kenőcsben (egy terecs egész fél ne-
 ezék egy obon zsírra). Ezen kívül igen hatályos a' kettediblaes hi-
 any (Deutojod. hydr. $\frac{1}{2}$ — 1 terecs egy obon zsírra) 's a' levált
 ehér higany ($\frac{1}{2}$ — 1 nehezék egy obon zsírra). A' meghűtés által
 isszatért főfájást, hányást 's gyomorgörcsöt okozó mohag meleg
 fürdő által hozatik legkönnyebben vissza. A' levedző mohag ellen
 helybelileg lágyító főzetek 's genyedésnél horgagír használtatik;
 mivel pedig a' beteg gyakran valamely senyvben szenved, a' barna
 inahéj forrázata vagy főzete, néhány szemer kénsavas kinal 's ibla-
 yos vas rendeltetik.

Viszketeg.

Prurigo. Prurigo scabida. Scabies papulosa
 Schönlein. Viszketegnek nevezük azon húzamos bőrkórt, melly
 öles egész lencse nagy, rendes bőrszinű, mindig elkülönzött, ke-
 tény, igen viszkető bubornyák által jellemeztenek, többnyire a' tör-
 süköt 's végtagok fészoldalát lepi meg és soha sem ragályos. Ily
 ubornya megnyomásánál egy csep tiszta savó ömlik ki, mire a' ba-
 ornya össze-esvén, barnás foltot hagy maga után; há pedig fel-
 akartatik, úgy e' savó mellett vér is ömlik, melly sötétvörös pörkké
 zárad 's ennek eltávolítása után fehér folt marad hátra. Következő
 ajait különböztetjük meg:

a.) Szelid v. Pr. mitis (Fror. T. 3. f. 1.) ha sok 's apró,
 többnyire a' végtagok fészoldalát elfoglaló bubornyák vannak jelen 's
 's viszketés mérsékes.

b.) Hangyádzó v. Pr. formicans W. et B (Bat. T.
 f. 1. Fror. T. 3. f. 1. 2. Behr. T. 14. f. 16) az előbbinek nagyobb

foka, nagyobb bubornyák, erősebb, kiállhatatlan viszketés 's nagy macasság által különbözik.

c.) A' vének viszketége Pr. senilis W. et B. Cnesmus vulgaris Fuchs (Bat. T. 6. f. 3. Fror. T. 3. f. 3. Alib. T. 57.) vénkoruaknál jön elő.

Ezen fajok lefolyása következő: kórkezdetével a' bőrön esupán kis egyenetlenséget veszünk észre, mely folytonosan nagyobbodván bubornyává válik. Ha ekkor a' felvakarástól megóvatik, 14 – 16 nap múlva össze-esik 's barna foltot hágy maga után; ha azonban, min rendesen történik, felvakartatik: úgy a' kiömlött vér kicsiny sötét vörös pörkét képez. A' folytonos vakarás következtében, mellynek a' betegek a' kiállhatatlan viszketés miatt ellen nem állhatnak, a' bőrön vértorulat, lob, később, kivált az alszáracon, beszűrődés támad, úgy, hogy gyakran lehetetlen rajta redőt képezni; továbbá repedések, pörkké száradandó anyag kiizzadása 's a' lágyékmirigyek folytonos megdagadása ered, melly utóbbinak jelenlétéből némely orvosok görvélykórra hibásan vezéreltettek. Ezenkívül a' vakarás által izzag, kivált az izzadmány elgenyedése által legtöbbször az alvégtagokon pörseg képződik (rüheges pörseg Impetigo scabida), vagy binesó pörseg (Eethyma) 's a' t., mellyek a' viszketeg megismerését igen nehezítik. Végre a' folytonosan jelenlévő, éjjel, főleg hőségben nagyobbuló 's minden nyugalmat elrabló viszketés által az egész életműség szenvedelembé vonatik 's többször vízkóros senyv fejlődik ki, melly bőr mell 's has vízkórt feltételezhet. Némelyek szerint a' vízkór a' viszketeg visszaveretése után is kifejlődik, azonban igen hajlandók vagyunk hinni, hogy a' hol ez tapasztaltaték, esupán esetlegesen történt, mert e' bajt kórszűny nem tételezi fel, még kevésbé hozza elő a' fennevezett bajokat a' esupán helybeli szerelés. Alibert e' baj eltünése után butaságot látott kifejlődni.

Alibert még egy fajt írja le a' bajnak: a' tetves viszketeg (Pr. pedicularis) nevezet alatt, melly a' hangyádzótól számtalan tetvek jelenléte által különböztetik. Mások szerint azonban e' baj — melly tetűkórnak (Morbus pedicularis, Phthiasis, Cnesmus Acariasis Fuchs) nevezetik — nem viszketeg, mivel a' tetvek jelenléte mellett esupán bőrfelturlás (excoriatio) bubornyák nélkül, 's a' vakarás következtében támadt vonalképző pörkők vannak jelen. A' viszketeg könnyen eleseréltethetik a' mohaggal 's rühhel, az el

ötöli elkül önzési jelek a' mohagnál adattak elő, a' rühtől következő-
ép különbözik :

Viszketeg.

Rüh.

Supán bubornyak.

Bubornyak, hólyagesák, pörse-
gek.

Az atkamenetek hiányzanak.

Atkamenetek 's bennük az atka.

Többnnyire a' feszoldalon.

Az újjak között 's a' hajt oldalon
jön elő.

Nem fertőz.

Fertőz.

A' viszketés kiállhatatlan.

A' viszketés nem olly nagy.

Mirigydag.

Mirigydag hiányzik.

A' kéz ritkán vagy csak később

Többnnyire a' kéz.

lepetik meg.

Gyógyíthatlan.

Könnyen gyógyítható.

Egy el nem nézendő 's igen érdekes — szigorúan véve, ide nem
tartozó — bőrbaj a' hubornya nélküli viszketeg Pr. sine
apulis W. et B Pr. latens Alib., melly egyes részeket lep-
én meg, iszonyú viszketés által jellemeztetik, a' nélkül azonban,
ogy a' vakarásra bubornyak mutatkoznának.

A' meglepett rész különfélesége szerint következő változatait
különböztetjük meg:

α) a' tenyér vagy talpbubornya nélküli viszketeg
nagy rohamokként fellépő viszketést okoznak, úgy annyira, hogy
a' meglepett egyének néha el is ájúlhatnak. Alibert két illy esetet
özöl.

β) a' gát 's tökborek hubornya nélküli viszketeg
többnnyire bőrpálással, izzaggal és mohaggal párosul 's a' részek
gymáshozzi érintkezése által támad.

γ) a' nemzőrészek hubornya nélküli viszketeg;
a' viszketés előtt hőség vétetik észre, ez után rohamként lép fel;
a' nőnemnél a' nagyajkakon 's esiklón fehér folyás, végbélkukacz
s a' t. férfiaknál a' makkoszorún az elváltozott 's meggyülemlett bőr-
enőcs által okoztatik. Ezenkívül még fan viszketeg, melly
apos tetű által, húdcső viszketeg, melly köszvény 's húgy-

kövek által, 's alfel viszketeget is, mely végbél-kukaczo 's aranyér által okoztatik, megkülönböztetünk.

Különös a' viszketegnek eltűnése új bajok megjelenésénél ' ezeknek begyógyulása utáni megjelenése.

Okvizsga. Erről majd mit sem tudunk. Nyomor, tisztátalanság, rossz táplálát, izgató étrend kedveznek e' kor kifejlődésének. Azonban a' legellenkezőbb körülmények között is észre vétetik.

A' jóslat legkedvezetlenebb, mert e' baj tökéletesen gyógyíthatatlan; ide tartoznak még a' gyakran beköszöntő általános bántalmak, mellyek néha a' halált is előhozhatják.

Gyógymód. Igen szomorú ily bajjal meglepett 's a' társaságból majd kizárt egyént szenvedni látnunk: miután rajta gyökeresen segítenünk alig lehet. Minden, mit tehetünk, csupán egy időre (1—2 hónapi) javulás, mely idő után többnyire visszatér. A' szerek, mellyek által ezt elérjük, általánosán csupán olyanok, mellyek a' bőrre igen izgatóan hatnak. Ajánltnak megérdemlik: a' zöld kenszappan, *) a' Handschuhféle ír, **) mellyekből a' két pokróczba burkolt mezítelen beteget az első három napon minden 6 órában 3 obonyit, ezután a' 4. 5. 's 6ik napon minden 12 órában 6 obonyit egy darab flanel által bedörgölünk, mire a' 7ik napon a' beteget egy általános meleg fürdőben egészen lemoszuk, — a' felbőr egészen lehámlik, a' bubornyák 's a' viszketés eltűnik; azonban $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ év múlva közönségesen ismét visszajönek. Ezen kívül a' kettediblaacs higany-ír (dr. β — j ad Une. j pingv.), mely azonban többnyire nagyobb bőrlobot hoz-elő, továbbá kénfürdők 's füstölgések is használtatnak. Legnagyobb hírre kapott a' Wilkinsohnféle mód, mely következőkben áll: miután a' beteg az első napon egy hashajtót kapott 's eczettel egész teste lemosatott volna, a' második napon — mi alatt a' mezítelen beteg két pokrócz közé burkoltatik — a' Wilkinsohnféle irral ***) bekenetik minden négy órában. Ötödik napon a' beteg eczettel mosatik 's megfürdik. Mivel ezen ír igen erősen a' bőrhöz tapad, ennek tökéletes eltávolítására 3 — 4 fürdők szükségesek. — A' viszketés ellen, valamint minden viszkető 's kivált száraz bőrba jöknél, az eczetteli mosások legsikeresebbek.

*) Rp. Kali caust. p. sp. 1,333 unc. sex Adip. Ceti libr. j.

**) R. Kali caust. p. sp 1,333 unc. sex. Axung. por. lib. j.

***) Flor. Sulf. Pic. liq. Ax. por. aa. libr. j Terrae cretosae unc. 4. Hydro sulf. Ammon. drach. 2.

III. Osztály. Pikelyek (Squammae.)

Mintbogy a' pikelyes bőrbajoknál különösen a' felbőr van bántalmazva, azért ezen osztályhoz olly felbőr rendetlenségeket is sorozunk, mellyek pikelyképzés nélkül jönnek elő. Mi tehát itt nem csak a' korpagot, halagot, fényleget 's pikelyeget — mellyek pikelyképzéssel járnak; hanem még a' felbőr sorvadást 's túltengést is ezen osztály alatt irandjuk le.

Korpag.

Pityriasis. E' név alatt olly tulajdonnemű, többnyire huzamos lefolyású 's nem ragályos bőrbajt értünk, melly vékony korpanemű 's folytonosan lehulló pikelyképzéssel jellemeztetik. E' határzat által minden — némelly kütegeket (kanyaró, bőrvöreg, orbáncz) követő — bőrhámlást, mint ide nem tartozót, kizárunk. Mi szerint a' pikelyek fehér, vörös, barna vagy feketés bőr alapon ülnek, egyszerű, vörös, tarka 's fekete korpagot különböztetünk meg:

a.) **Egyszerű k. P. simplex.** Apró liszt vagy korpanemű, rendszeres színezetű bőr alapon ülő 's folytonosan lehulló pikelyek — varkárás által szelíd viszketéssel párosulva — jellemzik e' fajt; többnyire egyes részeket 's ritkább esetben az egész bőrrendszert lepi meg. — Az általános egyszerű k., melly mindig másodlagosan különféle senyvek (gümő-vízkór) következtében lép fel, méltánylást nem érdemel. Érdekesebb a' részletes k., mellynek igazi ismerete minden orvosnak szükséges. Ámbár ez akármelly testrészt meg lehet, még is leggyakrabban a' fejbőrön jön elő, Willan 's Bateman-tól a' fejkorpag *Pit. capitis* (Bat. T. 15. Fror. T. 8. f. 1. Behr. T. 17. f. 2.) név alatt iratik le.

Két változatát különböztetjük meg:

aa.) **Korpa-alakú fej k. P. capitis furfuracea.** *Porrigo furfurans* Alib. *Tinea furfuracea*. (Alib. T. 14. Behr. T. 7. f. 7.) Ennél a' fehér, korpanemű 's nagy számmal előjövő pikelyek egész felületökkel a' némellykor érdes 's gyakran vörös fejbőrön ülnek, csupán ezen 's az arczon jönnek elő. Ha a' főporral, kenőccsel 's a' t. betisztátalanítatik: a' pikelyek összecsoportosodása által 1 — 6 vonal vastag, fehér, fénylő pörkék

támadnak. E' baj, különösen ha a' pikelyek színesek, az izagg cserélthetők fel; mindazáltal a' következő pontok a' kórhatárz biztosítására mindig elégségesek.

Korpag.

Izzag.

A' bőr a' pikelyek elmozdítása után rendes vagy csak kevésbé vörös.

A' bőr igen vörös, sőt olykékes vörös.

Csupán a' fejbőr van bántalmazva.

Itt a' fülek köztakarói is.

A' bőrfelület nem nedvez.

Nedvez.

A' viszkettség esekély, néha hiányzik.

A' viszkettség nagy 's gyakrógető.

A' bőr nincs beszűrődve.

Nagy beszűrődés.

bb.) Foszkőalakú k. *P. amiantacea*. Porr. amian Alib. *Psydracia tinea amiant* Fuchs. *Tinea amian* vel *asbestinea*. (Bat. T. 38. Fror. T. 20. f. 2. Alib T. 15. Behr T. 11. f. 9.) E' bajt nagy mennyiségű fényes, fehér, csőalakú pikelyek jellemzik, melyek az egyes hajakat körülövedzik 's a' bőrhöz függőleges irányban vannak, mi által nagy hasonlóságot nyernek a' tokodzó madarak tollaihoz. Minthogy ezen pikelyek a' bőrhöz igazgyöngén tapadnak, könnyű horzsolással eltávolíthatók 's ekkor mi a' foszkőszálak látszatnak. Ezen alakot az által ismerhetjük meg leginkább, ha a' hajazatot fésű segédelmével kétfelé osztjuk, mivel ekkor a' fennevezett pikelyek legkönnyebben láthatók. Az első alak ezzel mindig szövetkezik, de az ellenkező nem tapasztaltatik. Ezen kívül a' korpagnak még más helybeliséseit is különböztetjük meg így a' szemhéj, szakál, ajk (ajk-fölrepedés) szemérem, tenyér, kéz korpagot, mely utolsók a' nehéz munkákat kezdőkniél — lakato ezipész, kőműves inasoknál — gyakran jönnek elő; továbbá a' arczkorpagot, mely nőknél igen gyakori.

b) Vörös k. *P. rubra*. (Behr. T. 17. f. 1. 4.) Willan Bate man e' név alatt e' bajtól különböző 's többnyire öregeknél tapasztalható bőrbajt értenek, mely gyenge bőrlób 's lisztes vagy kékas pikelyek által jellemeztek 's a' terült fényleghez hasonlít. Mások szerint a' naphév vagy más ingerek — tűz, csipős lég 's a' t.

fedetlen testrészekre külső huzamosb behatásokra támad, 's ekkor vörös, nyomás által megfehérlő bőrfelületen nagy számu kisebb nagyobb vékony pikelyek vétetnek észre, mellyek nem sokára lehullan, új pikelyzésnek adnak helyt. E' bajhoz nagy bőrlombok 's izzagok szövethozhatnak, minthogy ugyanazon indokokból eredhetnek, 's csak a' beható inger különféle fokát mutatják; miszerint a' kisebb ingerbehatás korpagot, még a' nagyobb bőrlombot 's a' legnagyobb izzagot hoz elő. A' bőrlombtól a' nagyobb lehámlás, az izzagtól a' nedvezés, beszűrődés, nagy égető érzés hiánya 's a' fehér pikelyek jelenléte által különbözik. A' vörös korpag ritkán általános baj, többnyire csak egyes a' beható inger helynek megfelelő részekre — hát, mell, fő, arcz stb. — van korlátozva. — Megjegyzésre méltó: ezen baj az ajkakon, mellyek vörössége $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ hüvelynyi területre elterjed 's nagy égető érzéssel párosult.

Füladatunk e' helyen Alibert szálékony korpasömöréről, *Herpes furf. volaticus*, is említést tennünk, melly nem egyébnek, mint hamar lefolyó korpagfajnak lenni látszik. Illyenkor többé kevésbbé bő 's különféle testrészekben előjövő liszt-nemű felbőr lefoszlás vétetik észre, úgy, hogy a' betegek mint lisztes molnárok néznek ki; melly bajhoz kivált a' melegben igen érzékeny 's vakarásra készítő viszkettség kapcsolódik; a' bőr rendszer 's esupán felületesen megvörösült.

e) Tarka k. P. *versicolor* W. et B. (Bat. T. 15. f. 2. T. 69. Fror T. 8. f. 2. és T. 38. 51. f. 9. Alib. T. 60. Behr. T. 27. f. 10.) Ez a' tarka bőr színezés végett így nevezett korpagfaj különféleképp árnyazott, többnyire sárgás barna foltokként mutatkozik, mellyeken a' leporlás történik, 's a' viszketés csekély. Schönlein esupán a' májfolt (*chloasma hepaticum*) változatának hiszi.

d) Fekete vagy indiai k. P. *nigra* s. *indica* W. et B. Ezen korpagfaj a' hévvonal alatt, Indiában szültetett 's Angolhonba átvitt kisdedeknél jön elő 's a' pikelyek, — mellyek bubornyákkal párosulvák, — fekete színezete által jellemezgetik.

A' kórokok majdnem tökéletesen ismeretlenek, de, hogy beható ártalmas külingerek — naphév, tűz stb. előhozhatják, bebizonyult, sőt támadásukra esorvás állapot is befolyhat.

A' jóslat többnyire kedvező 's ritka esetekben makacs e' baj, több időt kívánván eltávolítására.

A' g y ó g y m ó d , melly a' gerjesztő okok homálya miatt esup a' betegség javalat betöltésében áll, a' korpag különféle fajai szerint különféle. A' fejkorpagnál legelőször a' pikelyek szappanvizes mosások által távolíttassanak el, 's ha akkor a' bőr ingerült állapotban találtatik, hideg mosások vagy zuhanyok használtassanak; fejbőr lazasága esetében kínahéjkenőes, eserzeny (Tanin) mosás — gr. 6. ad. une. sex aq. d. s. — eserfahéj, tormentila főzetek, Klaatschtól ajánlott fehér húnnyor (veratrum album) gyökér főzete, ugy szinte léleli, timsó olvadékkal, Goulard vízzeli mosások 's Péru balzsam javasoltatnak. — Az arezkopagnál az arezbor érdeesség eltávolítására minden 24 órában egyszer bekenetik a' korpávetkező kenőes: Rp. Spermat. Ceti dr. duas — une. semis Amygd. q. s. f. ung. molle. A' vörös korpagnál előbb a' torulások lapot mozditassék el, melly ha részletes, hideg mosások által, ha pedig általános, fürdők által eszközöltetik. Az ajkak megtámadása ellen a' hideg borogtatások legjobbak, a' kiszáritó szerek használás ritkán kívántatik. A' tarka korpag ellen olly szerek használhatnak, mellyek a' felbőr leporlását izgatás nélkül eszközölik. E' szerek között legczélszerűbbek az égető hamag olvadékkal mosások (dr. 1—2 ad aq. d. s. unc. sex), mellyek azonban nagyon órámenyek ne legycnek, hogy a' nagyobb izgatás által tetemes felgyógyulás tény letét ne történjék; e' szerekhez tartozik még a' borax olvadékkal mosások (dr. 1—2 ad une. 1. Aq.), a' rágó higany, a' halvány gös mészeg, az égető mész 's a' sófürdők; azonban mindig szükséges segéd-szereket is mint meleg fürdőket 's szappanmosásokat használni.

Halag.

Szemölcse ny. Ichtyosis. Ha a' bőrszemölcsök megkeményednek, 's a' fölöttök képzett pikelyek le nem esvén, érdes száru állományuakká válnak, több különfélekép futó barázdákat önkön magokra — mi által a' bőrnek hal vagy kigyó bőréhez hasonló kületem kölesönzenek — akkor a' bőr ezen beteges állapotát halagnak vagy halhéjkórnak nevezzük. E' bajt Thomson igen helyesen a' gumósesos bőrbajokhoz számítá. — A' különféle írók a' halagnak különféle fajait jegyzik meg, de a' mellyek esupán színöl 's kiképlődési fokokra változnak egymástól.

a) Egyszerű h. Ichth. simplex Wet B. (Bat. T. 16. Fr

T. 9. f. 1. 3. Alib. T. 62. Behr. T. 29. f. 2. 5.) E' bajnál a' meggyült pikelyek a' bőrön eleinte mint börszeny néznek ki; de később meg-nagyobbodnak 's több sorozatokban tűnnek fel, mellyek alatt kicsiny felemelkedések (megkeményedett börszemölcsök) találtatnak. Illy felemelkedéseken az ujjak elhuzatván: azon érzést adják, mintha az ujjak ráspolyon huzatnának. Valamint a' hajtó felületeket, úgy az arcot is megkiméli, — ámbár mi egy kórodánkban észlelt eseten itt is találánk. — Alibert még fénylő halagról (Icht. margaritacea, nitida) is tesz említést, ha a' pikelyek fehérek 's fényesek; 's kigyószinűről (Icht. serpentina), ha a' pikelyek vékonyak, finomak 's zöldesek (lásd Alib. Monogr. der Derm. II. kötet 475. old.)

b) Szarunemű h. Icht. cornea Alib. Ez akkor támad, ha a' pikelyek sötétebb színezetet 's szaruállományt öltnek magokra. Wil. 's Bat. e' névvel jelelék meg Plenk börszaruit (cornua cutanea), mellyek azonban, mint ide nem tartozók, a' felbőr túltengése alá soroztatnak.

c) Tővises h. Icht. hystrix. Leontiasis hystrix. (Alib. T. 63. Behr. T. 29. f. 4. 6.) Itt a' pikelyek fedelékesen egymás felett vagy kicsucsosodván, tövis módra állanak ki. Ezen igen ritka 's a' ruhával fedett testrészeken előjövő bajtól meglepve vala Lambert család, mellyről Alibert tesz említést.

Kórok. E' többnyire veleszületett vagy a' szülés után nem sokára kifejlődő bajnak kórgerjesztő okai ismeretlenek. Hogy csupán tisztátlanság e' bajt nem hozza létre, azon tény elegendően bebizonyítja, miszerint a' jelenleg uralkodó spanyol királyné is e' bajban szenved.

A' jóslat kedvezetlen, mert csak igen ritkán sikerül e' valóban makacs bajt meggyógyítani.

A' gyógy mód meg igen hiányos. Willan modora fürdőben a' pikelyek körmökkel eltávolítása különös jó foganattal nem bír. Czélszerűbbek a' pikelyek eltávolítása után — melly langyos fürdőkben pépek vagy olajos bedörgölések használatánál daróczczal vagy kefével intézett dörzsölések által legkönnyebben kieszközölhető — az égető hamag, a' kettediblacshigany olvadékkal mosások, az alhigiblac 's ketted iblacshigany ir bekenések. Ezeken kívül ajánltatnak még a' zsongító szerek, Goulard vize, a' kénsav 's a' részletes halagnál hólyagtapaszok; nem különben a' füstölgések, a' kén

's enyves fürdők is. E' külszereléseknél a' kórt belszerekkel is orvoslhatjuk. Thomson különösen a' sós lórom (*Rumex acutus* főzetét *) dieséri, melly azonban kórodánkban minden fogamat nélkül használtaték. Igen kedvező eredménnyel láttuk használni kórodánkban 1841. Prof. Tognio alatt a' keseredés venyige forrását, naponként két nehezékkal kezdvén, három obonyig felhagyva. Említésre méltó még a' kátrány (*Pix liquida*) felhasználata labdacikk alakban fél nehezékkal kezdvén egész fél obonyig egy napra. Kevesebbé ajánlható az igen is veszélyes 's szigorú elővigyázatot igénylő Fowlerféle olvadék. — Azonban senki se hiddje, hogy ezek előszámlált szerek által bizonyos gyógyulást eszközölhetünk, melly szer birtokunkban még nincs; de használtatni mégis megérdemlik, mivel ha gyökeres gyógyítást nem is, legalább a' baj javulását előhozzák.

Fényleg.

Psoriasis. Elkülönzött vagy összefolyó, különféle idomú vörös barnás foltok, fehér apró fényes pikelyektől fedvék, mellyek leesvén, finom ingerlékeny bőrfelületet mutatnak, 's a' kór lefolyása után barna foltokat hagynak — jellemzik a' fényleget. Ezen baj majdnem mindig idült lefolyású 's soha sem ragályos. A' különféle kiképződési foka, 's a' meglepett rész különfélesége okozá: hogy a' szerzők a' bajnak igen sok fajtát különbözteték meg. Ki e' bajt kezdetétől megfigyázhatja, az ekkor több egymástól elkülönzött vörös pontokat láthat, mellyek nem sokára apró fénylő fehér pikelyekkel fedetnek, gyakran viszketéssel párosulvák; ilyenkor idomok végett pöttyös f. *Ps. punctata* W. és B. névvel neveztetnek. Ha hosszabb tartás mellett a' jelenlévő pikelyek körül új pikelykarima képződik, 's csöp idomot ölt magára, akkor csepegetett f. *Ps. guttata* W. et B. (*Bat. T. 9. f. 1. Fror. T. 5. f. 1. Behr. T. 15. f. 7—9.*) neveztetik. Ha körületekben ismét terjednek vagy egyesek összefolynak 's egy pénzmemő nagyságát eléri, körülírt f. *Ps. numularis*:

*) Rp. Rad. Rum. acuti unc. n. nam coq. c. 2. libr. ag. aq. remanentia librae unius. Col. D. Egy nap alatt használtassék fel, 's némellykor főzettől bekövetkező hasmenés meggátlására, néhány csepp mákonyfésztvényt adunk hozzá.

circumscripta conferta mondatnak. Miután ezen pikelyektől fedett foltok átmérőjökben $\frac{1}{2}$ —1 hüvelyt elérnek, mindig közepökben gyógyulnak először; míg körületekben tovább terjednek, 's e' szerint körképet vesznek magokra, innen a' körkörös f. *Ps. orbicularis* elnevezés. Ha már most e' körök csupán félkörként gyógyulnak, 's a' meg nem gyógyult körszeletek egymást érintik, miszerint tekeres alakban tűnnek föl: úgy az igen érdekes alaka e' bajnak a' tekeresezett f. *Ps. gyrata* W. et B. (Bat. T. 12. Fror. T. 12. T. 7. f. 2. Behr. T. 16. f. 2.) támad. Ha a' felül-irt foltok mindjárt támadásuk után nagygyá, egyenetlenné összeolvadnak, 's nagyobb testfelületre terülnek, a' pikelyek nagyobbak: úgy e faj széttért f. *Ps. diffusa* W. et B. (Bat. T. 9. Fror. T. 5. f. 2. 3. és T. 6 f. 1. 2. Alib. T. 27. f. 2. Behr. T. 15. f. 10. 11. és T. 16. f. 8.) neveztetik, mellynél a' nagyobb viszkettség miatt okoztatott vakarás a' bőr vörösségét 's izgatott állapotát feltételezi. Ha ezen izgatott állapot még inkább felmagasítatik: a' pikelyek nagyobbak, vastagabbak lesznek, 's a' bőrben repedések, fekélyek támadnak, úgy azon alak támad, mit *levedző* vagy *fekélyesülő* fénylegnek *Pr. agrya s. invetera* W. et B. (Bat. T. 13. Fror. T. 6. f. 3. Behr. T. 16. f. 3. 5. 6.) nevezünk.

Mind ezekből világosan kitetszik, hogy a' fénylegnek ezen fajai csupán e' kór különféle kiképződési fokának tekinthetők, mint-hogy azok egymástól lenyegesen nem különböznek, 's csak a' könnyebb betanulás 's megismerés végett vétetnek föl.

Jelenleg csak a' részletes fényleget tárgyalandjuk, melly különféle nevezet alatt ismertetik. Legelőbb a' pékeknél 's más tűzzel dolgozóknál a' kézhátán előjövő fényleget említjük meg, a' pékek f. *Ps. pistorum*, de a' melly többnyire izzag, mit a' különböző gyógyrendelet végett tudnunk kell. Ugyanez áll a' mosónék f. *Ps. lotricum*. felől is. Will. és Bat. még az ajk, szemhéj, fityma, tökbörék fényleget felhozzák, ezek azonban igen ritkán jönnek elő. Fontosb a' tenyér f. *Ps. palmaris* W. et B. *Herpes squamosus centrifugus* Alib. (Bat. T. 14. Fror. T. 7. f. 3. Alib. T. 27. f. 1. Behr. T. 16. f. 6. 7.) ez legtöbbször bujakóros eredetű.

A' nem bujakóros következő jellemekkel bír: fehér nagy, érdes pikkelyek, mellyek nem fél körképen — mint a' bujakórosnál — te-

rülnek, 's ritkán mélyen harapódnak; legtöbbszörre mosonékn jön elő.

Ha e kór folyama alatt semmi gyógyszer sem használtatik, beteges bőrrész gyakran 1—3 vonal vastag, fehér, érdes pike sorozattal fedetik be, 's ez által olly kületem ölt magára, mintha kór tával vagy mésszel bevonva volna; ellenben ha különszínű írok használtatnak, ezek szerint a' pikelyek majd sárgák, majd barnák, fekete-keték 'stb.

A' kórismére nézve megjegyzendő, hogy a' fényleg ritkán terül nagy felületekre, többnyire csak egyes részeket lep meg; mind azáltal egy testrészt sem kimél, 's majd mindig a' könyökön 's térdkalácson jön elő — azonban e' részeket soha sem lepi meg a' bujakóros eredetű; hanem többnyire a' tenyérre 's a' fejbőrre korlátlódló, melly részek szinte a' nem bujakóros eredetűnél esupán a' később lefolyás alatt lepetnek meg.

A' fejbőrön előjövő fényleg, a' korpag, izzag 's mohaggali elcserélésre szolgálhat okul, azonban a' többi testrészeken — hol a' fényleget könnyű megismerni — való jelenléte, a' vörös 's vakarás által könnyen vérző felület, a' esekély viszkség, a' bőrnedvezés 's beszűrődés hiánya mindannyi biztos kórkülönlzési jelek. Nem annyira biztos a' kórisme azon esetben, ha a' bőrön esupán vörösség — pikelyek nélkül — kivált fördő után van jelen, mi által könnyen izzag, vagy farkaskütegnek tartathatik; ezen elvétel meggátlásán legezelszerűbb a' beszűrődés jelenlétét megvizsgálni, melly a' beteges 's egészséges bőrrész viszkonlagos összehasonlítása által — egyik kéz ujjaival az egészséges, a' másikkal a' bántalmazott rész vörösségét képezvén — történik. A' beszűrődés jelenlétéből izzag vagy farkaskütegre, hiányából fénylegre következtetünk, 's ez a' legfőbb kórkülönlzési jel; a' küteg terjedelme, símasága vagy érdessége, a' vörös felület, a' vakarásra történő vérzés, a' viszkség 'stb. sok kivételeknek vannak alávetve; azonban a' nem sokára megjelenő pikelyek vagy hólyagesák megerősítik vagy hiusítják a' felvett kórismét.

Ökvizsga. A' fényleg — mint legtöbb bőrszenvek — ok nem eléggé világos. Gyakran örökösödési hajlam van jelen. Legtöbbszörre az alsó néposztálynál gyermekeknél 's nőknél jön elő, köztvényes, részeges 's bujasenyves egyéneknek gyakori, görvélykórosoknál ritka.

J ó s l a t. A' bőr részintes bántalmazásánál elég kedvező, mint-hogy ezélszerű szerelésnek többnyire enged; azonban ez az elterjedt fénylegről nem áll, mivel a' leghatályosabb szereket is kijátsza, mi a' kórokok homályossága miatt nem csoda.

G y ó g y m ó d. Mint minden más kóroknál, mellyek lényege ismeretlen, úgy itt is egész sereg gyógyszer ajánltatik; külsőleg ha bőrizgatás van jelen, egyszerű langyos fürdők, 's ennek eltávolítása után természetes vagy mesterséges kénfürdők, a' bőrérdességnél olaj 's zsíros bedörgölések használatnak. Nagyobb hírre kapott a' bőrátalakulásait másító szereket részint kenőesben, részint olvadékban, mint az alhigiblaes, kettediblas higany, könleges higag, a' levált fehér higany, kénsavas iblag (jodum sulfuratum) rágó higany (gr. unum ad une. unam aq.). Az elterjedt fénylegnél igen szép eredménnyel alkalmazánk a' kettediblas higany olvadékkal mosásokat. *) A' levedző lényegnél legjobb a' horgag-ír. — Ezek mellett minden makacs fénylegnél beszerelés is használtatik, mint szárcsagyökér, gaják, Zittman főzete. A' veszélyes mirenykészítmények helyett ezélszerűbb az égető hamag olvadéka (gutt. 10—30 in emuls. amygd. dulc. v. amar.) annál inkább, mivel az olly gyakran jelenlevő köszvényes kórszűny az első utak savany képlődéssel jár, és a' körös bogár festvény, (napjában három cseppel kezdván, lassauként egész 25ig hágván fel).

Pikelyeg.

Lepra Will. Psoriasis leprodes Schönl. Herpes furf. circinatus Alib. Psor. scutellata Fuchs (Bat. T. 7. 8. Fror. T. 4. f. 1—3. Alib. T. 24. Behr. T. 15. f. 1—5. 12 és T. 16. f. 1.) Ezen többnyire makacs kór következő tünetekkel lép fel: köridomú, különagyságú vörös foltok, sima egymásra halmazandó fehérlő pikelyektől fedetvék, közepökbe bemélyülést mutatnak, 's kiálló vörös karimától körülvétetvék; ha ezek egybefoly-

*) Rp. Merc. corros. gr. 8. Kali hydroj. dr. 1. solve in A. d. libr. 1. Itt a' hamiblag túlnyomó mennyiségben legyen jelen: hogy vegytani szétbomlás által képlődött kettediblas higany felolvadva maradjon; mert ha erre figyelem nem fordítatik, a' kettediblas higany mint vörös 's felolvaszthatlan por leválik.

nak karimájokon a' körképű idomot megtartják. Ha e felhozott jeleket szigorúan átvizsgáljuk, tapasztalni, hogy egy sem — körző felemelt karimát kivéven — képes ezt a' körkörös fénylegte különzeni; igen valószínű tehát, hogy a' jobban kifejlődött körkörös fénylegnél nem egyéb; azért nagyobb egyszerűség végett legcélszerűbb volna a' pikelyeg nevezetet a' bőrszenvtanból végkéltörölni.

Will. 's Bat. három fajt különböztetik meg:

a) *Közönséges p. L. vulgaris*. Kiesiny, köridom, vörös foltokkal kezdődik, mellyek fehér fénylő foszkőhason pikelyektől fedetven, nem sokára tallérnagyságra terjednek, míg központjukban — a' gyógyulás miatt — bemélyülnek, a' viszkettség igesekély. Tartósb folyamán az egymásra halmozott pikelyek vastas felemelkedő pörköket képeznek. A' kitörés többnyire a' végtagokon kezdődik, 's közönségesen mind a' két karon 's ezombon egyszerre innen a' hasra, mellre 'stb. terjed, az arez majd soha sem lepetik meg.

b) *Enyhe p. L. alphoides v. mitis*. Az előbbi faj esékélyebb foka: a' foltok apróbbak, a' pikelyek vékonyabbak, egymásra nem halmaztatnak, 's az egész kór esupán a' végtagokon szorítkozik.

e) *Feketélő p. L. nigricans*. Ezen igen ritka faj esupán a' foltok 's pikelyek szentes színe által különbözik a' közönségestől, 's valószínűleg a' jelenlévő visszeres kórvegy által — mint az iszákosoknál — fejlődik ki. Biett bujakórosnak hiszi.

A' pikelyeg kórokáról majd semmit sem tudunk. Az örökösödési hajlam gyakran bebizonyítatik, görvélykórosoknál is gyakori. Hogy tisztátlanság nem okozza e' bajt, kiviláglik onnét: mivel Londonban, hol gyakori, többnyire fiatal egyéneket, kivált hölgyeket a' felsőbb néposztályból lep meg.

A' jóslatról 's gyógymódról az áll, mit a' fénylegnek eléggé megemlítünk.

Alibert még a' fehér pikelyeget (*Leuca*) 's a' pör p. (*Spiloplaxia*) említi; azonban mivel e' fajok vagy soha több vagy csak külföldön jönnek elő, reánk nézve kevés érdekléssel bírnak csupán nevöknél említettük. (Bővebb leírását lásd Alib. Monogr. der Derm. II. k. 154. 's következő lap.)

Felbőrsorvadás.

Atrophia epidermidis. Vagy veleszületett vagy többnyire később szerzett, 's vakarás — hólyagesa, pörseg, fekély 'stb. — által feltételezett állapot. Három fokát különböztetjük meg:

Az elsőfoknál csupán fehér pöttyözött vonalokat látunk, mellyek a' felbőr legfelsőbb lemeze lekopása által támadnak, 's esékely viszkettséget okoznak. Ha tetemesb viszketésnél vakarás által a' felbőr elroncsoltatik, de az albőr még ép, úgy a' kiizzadt nyirk sötétsárga pörkökké szárad; mi világos bizonyosságul szolgál arra, hogy még vérrel nincs vegyítve, 's ez a' 2-ik fok. A' harmadik fok az által ered, ha nem csak a' felbőr, hanem csak az albőr is megvan sértve. Innen a' véredények megsértése miatt vérömlény történik, miáltal az izzadt nyirk sötétvörös-barna pörkökké szárad. A' jelenlévő pörkők színéből 's különféle alkatából a' viszketés fokára következtethetünk; így, a' viszketegnél sötétvörös, a' mohag 's rühnél világosbszínű pörköket, a' korpagnál csupán fehérlő vonalokat veszünk észre a' bőrön, mivel az említett kóroknál a' viszketés foka tetemesen különbözik.

Ide számíthatjuk még a' bőrrpedékeket (*rhagades*), mellyek vagy csupán a' felbőr vagy az egész bőr tátongásban áll; többnyire az ízek feszdoldalán vétetnek észre, 's más kütegekkel, mint: izzag, mohag, viszketeg, fényleggel párosulvák. De ezek nélkül is vétetnek észre azon egyéneknél, kik magukat ollynemű befolyásoknak teszik ki; mellyek — a' hájvesztés következtében — bőrerdességet fejlesztenek ki, mint ezt mosonőknél, szappanosoknál 'stb. láthatni.

A' gyógygy mód e' bajnál lágyító fürdőkben 's mosásokban áll, ezenkívül a' bántódott részek hāj vagy olajjal bedörzsölésében.

A' felbőr túltengése.

Hypertrophia epidermidis. Excrecentiae. Többnyire egyedül a' felbőrrre szoritkozik, azonban igen gyakran vonatik az albőr is e' szedelembé, 's ez által különféle felületes, többnyire fájdalomtalan bőrfelemelkedések támadnak.

a) Kéreg. *Tylosis. Callus W. et B. Tylosis indu-*

rata Alib. Részletes, érzéketlen 's állandó felbőr megvastagodás, melly erőműves nyomás vagy dörzsölés által támad; többnyire rendes bőrfelületen ül, 's esupán akkor sorvad el a' bőr, ha a kéreg igen nagy, mindig kellemetlen érzést okoz, 's ha igen rég megcsáradván, fájdalmat, bőrrepedéseket 's lobot feltételez. A' kéreg különféle részein előjövő kérgekről egyedül, sok kézműveseket is merhetni meg.

b) Tyukszem. *Clavus. Tylosis gomphos.* Alib (Behr. T. 28. f. 4—7). Kemény, kerekded, szarunemű állomány melly közepében maggal bír 's alapján igen érzékeny: a' felbőröt kívül mindig az albőr is bántalmazva van, 's gyakran a' kéregből támad, tehát valószínű: hogy a' tyukszem nem egyéb, mint a' felbőr túltengése, melly egész az albőrbe behat. A' tyukszem legtöbbször a' láb ujjain jön elő, és pedig azok külső, vagy belső oldalán, az első esetben mindig tetemes kéreg van jelen 's a' tyukszem domború; az ellenkező az utolsó esetben tapasztaltatik, mivel a' folytonos ellendörzsölődés által a' felbőr lekopik 's a' tyukszem homorúvá válik.

c) Varancs. *e eruea.* Ezen apró, kemény bőremelék többnyire a' kezeken jönnek elő, 's egy túltengett szemölcs testecskéből 's a' felbőr megvastagodásából áll. Megkülönböztetünk szélével alappal (*V. sessilis. V. vulgaris* Alib.) 's keskeny alappal felülőt (*V. acrochordon*), továbbá káposztafej idomút (*Myrmecia*. Behr. T. 28. f. 1—3.). Ha a' varancs veleszületett állapotban van, *varaneros* anyajegynek — *naevus verrucosus* — nevezik, melly az ugynevezett lenese anyajegytől — *naevus pilus* — érdes felülete által különbözik.

d) Bőrszaruk. *Cornua cutanea. Dermatoceras* (Behr. T. 28. f. 8—15.) székők majd esupán a' felbőr, mellynek lemez halmazata által 2—9 hüvelyki hosszú kidudorodásokat okozhat; majd a' tüszők, 's ekkor haj helyett nőnek 's bőrrel vannak bevonva, melly az emelék helyén hiányzik. Nagyságuk 's színezetük különféle, nőknél gyakoribb, mint férfiaknál.

Gyógymód. Legelőbb az ártalmas kórgerjesztő ok mozdíttassék el, ezután a' kéregnél naponta fürdők olajjal 's zsírral bekenések vagy késseli eltávolítás használtatnak. A' tyukszemek ellen legjobb a' tyukszem-koszorúk, mellyek finom, alapjokon taplóva

bevont bőrből állanak, 's közepökben a' tyúkszemnek megfelelő lyukkal ellátva vannak; ezek mézga által oda tapasztatnak, 's felökre ragtapasz tétetik; vagy lágyító fürdők használata mellett ibló keñőes (Jodinae gr. 12. ad dr. 1. Ax.) használtatik. A' varanásokra az etető szerek közül különösen a' tömény kénsavat használjuk, mielőtt a' körző rész — nehogy az etetés ide is elterjedjen — viasszal bevonatik, két egész öt cseppet alkalmazván naponként, a' tökéletes gyógyulásig. A' bőr-szaruk kés által távolítatnak el.

IV. Osztály. Hólyagesák (Vesiculae).

A' hólyagesákhoz következő kütegek tartoznak: a' sümöreg, az izzag 's a' rüh. — A' köleség a' kütegek alatt, a' víz-izzag (sudamina) az izzag alatt adatik elő.

Sümöreg.

Sümör, Herpes. Olophlyetis Alib. E' [név, melly a' bőrkórtanban járatlan orvosgyakornokok menköpenye volt, sok tévedésekre szolgált alkalmul; sőt még most is vannak orvosok, kik e' nevet a' különnemű bőrkütegek megnevezésére mint általánost használják. Willan 's Bateman voltak elsők, kik e' kütegnem helyét a' tágas bőrkórtani mezőn kijelölék, 's ezt közelebbről meghatározzák. Ezek után a' sümöreg alatt heveny, soha sem ragályos, elkülönbözött, egyes, rendetlen csoportozatokba előjövő hólyagesás bőrbajt értünk, melly gyulladásos a' csoportozatokat túlhaladó, égető fájdalmakkal járó 's sárgás-barna pörkökké átalakulandó alapon fekszik. A' pörkök lehullása után vörös foltok maradnak vissza.

A' sümöreg lefolyásánál három időszakot különböztethetünk meg. Az első időszakban ollykor láz, fájdalom — a' esekély esipkedéstől a' legkínzóbb égető érzésig — jelenkezik; mintha a' meglepett bőrrészek izzó szénnel érintetnének. A' másodikban a' láz enyhültével vagy megszűntével a' bőr felületen vörös foltokból álló csoportozatok mutatkoznak, 's ezeken bibék képződnek, mellyek 24 óra lefolyta után hólyagesákba változnak. Ha illy hólyagesák többen egybefolynak, bugyokat képeznek. E' folyam tékörébe ismét uj kiütés támad; ez bevégződván, mellette megint uj kitörés — mig a' bőr nagyobb része e' bajtól meg nem lepettetik. Az utókitörés soha sem ered a' már egyszer meglepett részen: hanem mindig mellette, mi által más hólyagesás kütegektől, különösen az izzagtól megkülön-

bőztetik. A' harmadik időszakban, miután a' hólyagesák néhány napig a' bőrfelületen tenyésznek, bennékök megzavarodni megszárad 's fölöttök pörk képződik; ez lecsván, néha erősen ége vörös foltot hágy maga után. A' betegség az új kitérészek miatt többnyire 10—30 napig tart.

A' sömöregnek következő fajait különböztetjük meg:

a) Gömbörös *S. H. phlyctaenodes*. *Olophlycti miliaris* Alib. *H. miliaris antiquorum*. (Bat. T. 49 Fror. T. 26. f. 1. Behr. T. 8. f. 2—4.) Miután e többnyire a' mellkas nyakán, karokon 's ritkán az alvégtagokon előjövő bőrbajt esorvás hurutos kórjelek előzték volna meg, az előbb említett helyeken ége érzéssel párosuló vörös foltok támadnak, melyeken hólyagesák képződnek. Midőn ezek kiképződési legfőbb fokukat elérték volna az égető érzés 's láz alább hagy, 's ha utókiütés nem támad, a' későbbi lefolyás a' fentebb leírt általános kimenetű.

b) Köralakú 's *H. circinatus*, *annulus herpeticus* s. *repens* (Bat. T. 51 Fror. T. 26. f. 2 Behr. T. 8. f. 10. 11.) Ezen alak a' sömöregnek, mely a' test fedetlen részein jön elő, az által ölt magára gyűrűs alakot, hogy a' csoportozat középső hólyagesái visszaképződnek (mintegy elvetélnek), míg a' körzők szokásos átalakulásain mennek át. Sokszor megtörténik, hogy a' gyűrűnek csupán $\frac{1}{2}$ vagy $\frac{3}{4}$ köre képződik ki. Ezen lázatlan faj nálunk ritkán, a' melegebb tartományokban gyakrabban jön elő.

c) Szivárvány s. *H. iris* (Bat. T. 52. Fror. T. 26. f. 4 Behr. T. 8. f. 12.) A' központi hólyagesa körül kisebb hólyagesákból egy kör, de később, képződik, a' hólyagesák összefolyván, mint egy sánezot képeznek; e' körül ismét egy kör, ritkán több képződik. Ez tökéletesen kiképezetvé, a' központi hólyagesának bennékök megszárad, az első kör bennéke genyed, míg az utoljára képződő kör fehér 's vörös udvarral van körülvéve: innen a' különböző színesedés 's a' szivárvány elnevezés. Leginkább a' kezeken 's lábakon, ritkábban az arcon jön elő. Igen gyakran megtörténik, hogy a' hólyagesák, kivált a' központiak, visszaképződnek, ilyenkor köralakú sömöregnek tartatik; vagy a' körző a' központival egybeolvadván ezafrangos, nem feszülő bugyot képez, 's ekkor könnyen összezsugoríthatatik a' heveny buboraggal. Ez az oka, hogy az utóbbiról másokkal ritkábban tesznek említést a' szerzők; miután a' szivárvány

sömöreg már jobban ismertetik. Sőt Dr. Hebra e' tekintetben igen túlzó lévén, az állítja, hogy talán a' heveny buborag nem is létezik; mivel az általa megvigyázott, 's neki mutatott illyenmő esetek mind szivárvány sömöreg voltak.

d) A j k. s. H. labialis. Olophycetis prolabialis Alib. Hydroa febrilis. Phlyctenosis lab. Fuchs (Fror. T. 43. f. 10. Behr. T. 8. f. 5.) Mindig csak egy más előremet, (különösen alhasi v. váltóláz) után vétetik észre. Az ajknak bántalmazott része megvörösödik, 's égő fájdalmak vagy viszkettség érzetével hólyagcsák képződnek, melyek a' szokványos lefolyást megtartják, 's az ajkakon vagy be- vagy kifelé terülnek; az első esetben a' belhámon támadt hólyagcsák rögtön felpattannak, 's az ugynevezett hurutos fekélyeket képzik. Ezek sokszor a' pofok belfelületén, a' nyelvcsappon 's másutt isjönek elő.

e) Fityma s. H. praeputialis. H. pseudosiphiliticus. Olophycetis progenialis Alib. Bat. T. 51 f. 2. 3. Fror. T. 26. f. 3. és T. 43. f. 12. Behr. T. 8. f. 5.) Ezen a' férfiaknál a' monyon, a' nőnemnél a' nagy szemérem-ajkakon előjövő faja a' sömöregnek vagy egyes hólyagcsákkal vagy hólyagcsa-csoportozattal — a' sömör általános kórtüneteivel 's szokványos lefolyásával jelenkezik. Ha csupán egy hólyagcsa mutatkozik, 's a' meglepett egyén szemérem részét tisztátalanul tartja; vagy ha a' megpattant hólyagcsa 's így eredett fekély csipős rágó szerekkel kezeltetik, sokszor ezen egészen ártatlan baj a' bujakóros fekélyekhez hason alakokat ölt magára; — 's innen történik, hogy némelykor másként igen ügyes orvosok azon tévelybe vezettetnek, miszerint e' bajt mint bujakóros fekélyt kezelik. Ez annál könnyebben történik, mivel közönségesen egyének, kik bujakóros fekélyekben többször szenvedtek, a' sömöregnek e' fajától majd minden közönsülés után meglepetnek.

A' sömöregnek a' bujakóros fekélyektől megkülönböztetése (ide értvén csupán az egycs 's elkülönzött hólyagcsákkal járó sömöreget) a' következőkben áll:

Sömöreg.

Bujakóros fekély.

A' hólyagcsa nagyobb.

A' hólyagcsa kisebb.

Az ebből támadt fekély könnyen terül, felüleges, sima szélekkel mintegy elmosva megy át a' körző részekbe.

Talaja tiszta, az elválaszték könnyen elmozdítható.

A' hús szemölcsök mint kicsiny
vörös pöttyök mutatkoznak.

Lefolyása enyhe 5—8 nap.

A' fájdalom csak a' baj elején
éreztetik.

A' fekély mély, egyenetlen, fe-
hajtott szigorún körülírt sz-
lekkkel ellátva.

Az ellenkező.

A' hús szemölcsök az erős
hozzáálló elválasztéktól ne
láthatók.

A' részek mind szélességökhöz
mind mélyökbe elroncsoltak.

A' fájás a' baj egész lefolyá
alatt éreztetik.

Legbizonyosb jel mindazonáltal a' beoltás.'

f.) Öv s. H. Zoster, Zona, Cingulum, Ignis sacer (Bat. T. 50 Fror. T. 27. Behr. T. 8. f. 7.) A' sömöregnek ez az alakja azon sajátságos hólyagcsa-csoportozás által jellemeztetik, mely szerint különféle szélességű öv képeztetik, mely a' meglepett rész többnyire félig ritkábban egészen övedzi. A' test minden részét meg lehet lepheti 's többnyire az idegek lefolyását követi. Hogy igen nagy befolyást eszközöl reá az idegrendszer, kiviláglik onnét, mivel a' bántalmazott részen igen nagy fájdalmat, ha a' bal mellkason előjött szívdobogást, a' végtagokon rángatózódásokat (Wiehmann) okoz. Alibert a' sömöreg ezen faját bőridegkórnak tartja. Recamier e' bajt az ülideg bántalmával láfá szövetkezni. A' sömöregnek ez az alakja csaknem mindig lázzal jár 's miután ez néhány napig előrement a' test különféle részein igen kellemetlen égető érzéssel párosult vörös foltok támadnak, melyek egybeolvadván 2 — 4 nap múlva hólyagcsákkal fedetnek 's szokványos lefolyásukat megtartják.

g.) Cazenave-tól legelőször leírt faja a' sömöregnek a' pikelyes s. H. squamosus köridomú, babnagy, kitünőleg mellen 's végtagokon előjövő, lassanként krajezárnnyira nagyobbuló foltok által — mellyeken igen kiesiny 's rögtön lejáró hólyagcsák képződnek, — jellemeztetik. Mihelyt a' hólyagesák elvirágoztak, csupán pikelyektől fedett foltok találtnak, mi által a' fény

eggel könnyen feleseréltethetik. Később a' folt közepét elfoglaló 's szélével a' körző pikelykéket érintő nagyobb pikely képződik, mely az egész foltot befedi.

Hogy a' könnyen történhető eleseréléseknek gátot vessünk, legfőbb feladatunk a' sömöreg e' szokványos lefolyástól eltéréseit, az állapot, mellyen ülnék 's a' képzett pörköket, mennyire tehetségünkben áll, természetűn lerajzolni:

1. Sokszor megtörténik: hogy a' sömöreggel járó kórtünetek jelen vannak, így: a' láz, a' bőr bántalmazott részén nagy fájdalom 's vörösség; de a' sömöreg kiütése még sem mutatkozik, vagy csupán a' bibe vagy bubornya képzéséig jó a' kitörés; például az övsömöreg csupán a' bolhaesipéshez hasonló 's félkört képző foltokig képződik vagy mint bubornya 's gumóesos bőrvöreg néz ki: innen hajlandók vagyunk azon véleményre, miszerint ezek csupán az övsömöreg tökéletlen kifejlési fokai. Éppen úgy a' szivárvány 's köralakú sömöreg csupán mint szivárvány 's gyűrűképű bőrvöreg vagy mint gyűrű alakú rózsag külekszik.

2. Az alap, mellyen a' hólyagszék tenyésznek, rózsapiros szín helyett fekete lehet, mintha üszök volna jelen. Ez közönségesen akkor történik, ha több hólyagszék összefolynak. A' fekete bőrrész alapjától elvál 's a' néhány véreseppék egybe elegyedvén, a' hólyagszék benékével fekete pörköt képez, mint ezt a' szivárvány sömöregnél tapasztalhatni.

3. A' pörkök mind színökre, mind vastagságokra különbözök; különösen a' száj körül 's az orron olly hosszúak lehetnek, hogy egy orszárvhoz hasonlitanak, a' sömöreg e' faja *Aliberttől* Dartere stalaetitiforme nevezet alatt iratik le, melly azonban nem egyéb, mint a' közönséges sömöreg következtében támadt pörkök halmgyüleme.

A' kórokok homályosak, némellykor a' bőrre vagy bélsztornára ható ingerek következtében fejlődik ki e' baj; az övsömöregnél az idegek befolyása valószínű.

A' jóslat kedvező.

Gyógymód. Minthogy a' sömöreg majd minden alakában magától meggyógyúl, csupán néző szerepet viszünk. Ha azonban a' láz igen nagy: lágyító lobellenes belszerelést használunk. Ajánlott, hogy a' bőrre hólyagtapaszt alkalmazunk, de mikor a' sömöreg

kiütése előtt? ekkor még ezt nem ismerhetjük meg; — a' kiút után? illykor nem szükség. Mások a' bódár füvekkeli borogatásot ajánlják, melynek a' szepnőnye, bürök, beléndek füvek borotvánmeggy vízzel; de ezek által a' fájdalmak nem nagyon enyhülnek még hamarébb hatnak, ha belőlről adatnak. Hideg vizzeli mosások eezetsavas szunyali (*Acet. morphii*) kenőes bedörgölése e' helyt lehatályosb fájdalomenyhitő szerek. Ha a' hólyagcsákból fekély képződnek, legjobb a' horgány pehely kenőcs. Mind ez többnyire csak az övsömöreg gyógymódára vonatkozik, minthogy a' sömör többi fajainál legjobb mit sem tennünk.

Izzag.

Eczema. Herpes squamosus madidans Alib. Ps. dracia Fuchs. Ezen igen gyakori 's fájdalom! többször félre mert baj kiesiny, gombostőfőnagy, egymáshoz szorított, többé kevésbé vörös vagy túltengett bőrfelületen ülő, viszketésséggel 's érzéssel járó hólyagcsák által jellemeztek, melyek folytonos harmatféle — a' fehér ruhákban ondóhoz hason foltokat előhozó folyadékot izzadnak ki 's vékony sárgás pörköket képeznek: ez lehullván, barnás foltokat hagynak magok után. Három fajtát különböztetjük meg: az egyszerű, vörös 's a' pörseges izzagot.

a) Egyszerű i. *E. simplex W. et B. Ps. dracia acuta vulgaris Fuchs* (Behr. T. 6. f. 4.) A' fen megírt hólyagcsák a' bőr különféle részein többnyire előrejárt általános kórjel nélkül, mindazonáltal igen nagy viszketésséggel képződnek; benn kök majd felszivatik, majd kiürülván, foltokat vagy kiesiny fehér pikelyeket képez, melyek leválván vagy eltávolítván, keveset vöröslő, de még nem túltengett bőrfelületet vechetni észre 's nem soká rendes alkatába visszatérván, nyom nélkül elenyész. Ezen faj gyakran a' kezeken, az újjakon jön elő 's ezért a' rühhel könnyen össze zavartathatik. Ezt tehát helyesen megismerünk nem csekélység, uvel ha az izzag a' ruh különféle izgató szerelése alatt kifejlődik, beteg baja mindig súlyosbúl 's ez által még nagyobb bajnak, mint milyenbe eredetileg szenvedett, tétetik ki.

b) Vörös i. *E. rubrum W. et B. E. mercuriale P. arson. Ps. dracia acuta, mercurialis Fuchs.* (Bat. 58. Fror. T. 30. f. 4.) Ha a' fentebb említett ugyanazon helyen hos

szabb vagy rövidebb idő után utókitörés történik, a' meglepett bőrrész nevezetesen megvörösödik 's nagyobb térimbe széled, mely fölött hólyogesák emelkednek; — a' kiizzadó folyadék egy része új hólyagesákat képez, melyek a' felbőr megvékonyodása miatt tüstént felpattannak és mint — kivált a' meglepett rész szélein észrevehető apró vörös pontoeskák mutatkoznak; a' folyadék más része folytonos 's fokenkénti beszűrődés által a' bőrmegvastagulására fordítatik. A' viszkettség mindig növekedvén, a' betegek oly iszonyú égető érzéstől kínzóztatnak, mintha forró kályhában pörsöltetnének, ez által vakaródzni kénytelenítetnek 's oly annyira elmarezangolják magokat: hogy a' bántalmazott részt fedő pikelyek helyett vérrel tölt barázdák tapasztaltatnak, — a' pikelyek az ágyban reggel nagy mennyiségben találtatnak 's az ágynemű saját folyadéktól 's vértől fedett. A' folytonos inger, a' különmemű átizzadó 's esípös folyadék 's a' vakarás következtében a' bőr mint a' karmin vagy az izzó vas megvörösödik; a' bőr vastagsága a' folytonosan történő beszűrődés által mindig tetemesb lesz, — mit legkönnyebben az által tudhatunk meg: ha egyik kézzel az egészséges, másikkal a' beteges bőrrészben redőt képzünk, ez más bőrbetegségektől igen nagy megkülönböztetési jel. — Ha tehát a' fennevezett hólyagesák igen vörös, megvastagodott, sárgás pikelyekkel fűdött, nagyon viszkető 's égető bőrfelület környéken találtatnak: a' haj vörös izzag néven neveztetik. Ha a' pikelyek eltávolítatnak, az egész bántalmazott bőrrész rövid idő alatt sárgáló folyadékkal fedetik be.

c) Pörseges vagy reesetes i. E. *impetiginodes* W. et B. *Psydracia acuta flavescens* Fuchs. (Bat. T. 55. Fror. T. 30. f. 1. 3, Behr. T. 6. f. 6. 7. 11.) Ha az előbb leírt faj a' fennemlített kifejlődési fokból egészségbe nem megy át, a' bőr jobban jobban beszűrődik, felduzzad, sötétebbre szinesedik és kékes vörössé változik, — a' hólyagesák helyett pörsegek képződnek, melyek felpattanván, vastagabb pikelyeket, szinte pörköket képeznek 's így e' baj átmenetet képez a' hólyagesás kütegekből a' pörsegekhez. Ha egy ily pörköt eltávolítunk, alatta vagy egy réteggenny találtatik vagy vöröses savó izzad ki. A' viszkettség 's égetés csekélyebb.

Az izzagnak ezen leírt folyama nem mindig ezen a' módon történik, sokszor megcsik, hogy a' vörös vagy a' pörseges izzag eredetileg lép fel, mielőtt az egyszerűt megelőzte volna, a' gyógyulásban

azonban ily visszaképzési rendeltenség nem tapasztaltatik, úgy hogy a' pörseges izzag előbb vörössé, ez pedig egyszerűvé változik.

Az izzag két utolsó faja hosszas tartásuk, az álmatlan éjek 's nagy nedvvesztés miatt a' beteget annyira elerőtlenítik, hogy nyomorú 's a' legnagyobb fokú senyves kületemet ölt magára, melly azonban nem első rendű 's nem az izzagot előhozó bántalomból, hanem második rendű 's a' nagy nedvvesztésből eredt. Ha e' baj több időt tart, úgy a' meglepett rész tetemesen megvastagszik, a' bőrben tövisek 's repedések történnek; a' beteg a' nagy kín mellett aszál és eszik 's csupán a' jótékony halál vet szenvedéseinek véget. Sajnos hogy ez gyakran történik orvosok jelenlétében, kik e' bajt félreismerék vagy megismervén ennek gyógyítását, az izzagos korcsvegyet vagy áttételektől félvén, nem kezelik. E' baj gyakorisága 's a' könnyen történő felcserélés miatt azt elkülönözve, a' mint az a' különféle testrészein jön elő, tekintendjük, csak azért is, mivel a' meglepett rész különfélesége szerint tetemes módosításokat szenved.

aa) Fejbőr i. E. capitis. Tinea muciflua. Psycia tinea Fuchs Porrigo mucosa. A' hajjal ellátott fejbőrön leginkább a' vörös és recsetes izzag jön elő; az első sok a' hólyagcsák által jellemeztetik, mellyek igen vörös, megvastagodott, viszkető 's égető, sok folyadékot elválasztó, sárgáló pikelyekkel fedett alapon ülnek; az egész fejbőrt ellepik, valamint mindig a' füleket, sokszor a' homlokot és szemöldököt is. A' hólyagcsák folyadéka a' hajak összetapadását okozza. Ha a' hólyagcsák helyett pörsegek támadnak vagy mindkettő, ha a' beszűrődött rész setétszínű kékes vörös, akkor pörseges izzag van jelen, ez soha sem lepi meg az egész fejbőrt.

bb) Fül i. E. auriculæ (Al. T. 25. Behr. T. 6. f. 9.) Ám bár ez a' fejbőrizzaghoz mindig szövetkezik, mégis olykor megtörténik, hogy magánosan is jön elő 's ekkor az álkapocs mozgás igen fájdalmas 's többnyire a' halljárat bedugulása miatt nehéz hallással párosul.

ec) Arcz i. E. faciei. Ezen igen gyakori 's könnyen felcserélhető változat közönségesen Porrigo larvalis, P. furfurans, crusta lactea, Herpes crustosus faciei név alatt iratik. A' Porrigo larvalis név alatt előjövő kútegek többnyire két kúteg- nem jelentésével bir; egyike az arczizzag, másika a' kor-

pörsege bélyegeivel van jelölve (ezeknek megkülönböztetéseit lásd a' pörsegeknél).

dd) Csöcs i. E. mammae (Behr. T. 7. f. 2.) Mindig a' csöcsbimbón kezdődik, honnan központilag terül szét. A' csöcsök kiscbe-
sedése szoptatóknál nem egyéb e' bajnál, még pedig többnyire a'
recsetes izzag alakában jön elő; ámbár olly egyénknél is, kik soha
sem szoptattak, tapasztaltatik.

ec) Köldök i. E. umbilici. Többnyire gyermekeknél 's
rüheseknél, ha a' köldökben rühatka lakik, jön elő.

ff) Mony i. E. penis (Behr. T. 6. f. 12.) Ezen részen csu-
pán a' vörös izzag tapasztaltatik 's ekkor a' mony tetemesen megda-
gad, rajta hólyagesák képződnek. Az orbánczról égető 's viszkető
érzés, úgyszinte a' hólyagesák, a' folyadékokoztá foltok 's pike-
lyek által különbözik.

gg) Borék i. E. scroti (Behr T. 6. f. 12.) A' borék vagy
nagánosan vagy az izzagnak a' szomszéd részekről elterjedése ál-
tal bántódik. Illykor mindig megdagad 's nagy mennyiségű savós
nedvvel borítatik, melly pörkökké szárad 's ezek alatt a' bőr megre-
pedvén, sok folyadék izzad ki.

hh) A' nemző részek körül képzett 's legelőször Dr. Hebrá-
ól leírt faja e' kütegnek a' korlátolt szélű E. marginatum
név alatt ismeretes. Ez többnyire azon határszélnél, hol a' borék
végződik, a' czombokon kezdődik, innen fel 's alá terül — mindig
a' borék széle mellett, — a' segnyilást környezi 's azon barázdába
végződik, melly a' segpofokat elválasztja, tehát azon helyen, hol a'
borék végződik; a' czombon több apró hólyagesák vagy vörös pontok
átszanak, mellyek vörös 's mérsékesen beszűrődött igen égető bőr-
felületen ülnek.

ii) Alfel 's gát i. E. podicis et perinaei (Behr. T. 7.
f. 3.) az igen kinzó viszkettség miatt, kivált aranyérben szenvedőknél
néltánylatot érdemel 's a' Prurigo perinaealis név alatt ismer-
etik.

jj) Kéz i. E. manus. Az izzagnak e' változata gyakorisága
miatt kivált kézműveseknél, igen érdekes. Csupán helybeli ingerek
által támad; sütőknél a' sütők rühe (Psoriasis pistorum) név alatt, a'
kőműveseknél, lakatosoknál, kovácsoknál a' tüztől cred; fűszeráru-
soknál (Psor. des épiciers) különös széke a' kézháta, főleg a' kéztő

felett, hol a' kéz redői a' bőr megvastagodása következtében igy kiképezve találtnak. Ha a' pörkök eltávolítatnak, nagyon viszkető, vörös vagy kékelő bőrfelületre jövünk (valamint vörös vagy pörseges izzag van jelen), mellyen nagy mennyiségű kiesiny 's folyadékot átizzadó vörös pontok mutatkoznak.

K ó r o k. A' kórgerjesztő okok közül a' bőrre munkáló különféle ingerek a' legfontosb behatások. E' kór támadását semmiféle beteg nem tételezi föl, azért a' némelyektől észrevett kóráttelek ez lényeges egybefüggésben nem állanak. Már említők: hogy e' b több kézműveseknél a' tűz, melly körül foglalkoznak, feltételez illy kórtámasztó ok a' napsütése 's illy fajtát e' bajnak Willan solare (Bat. T. 56. 57. Fror. T. 30. f. 2. Behr. T. 6 f. 5.) ne alatt írja le. Szinte illy kórgerjesztőleg működnek több bőringer szerek, mint: a' kénsavas réz, kén, mérges szömöreze, húnyc higany, iblany, meleg fürdő. Itt különösen meg kell jegyezni, hogy a' beteg meleg, kivált kénes fürdőben fürdik, ezen nem szokott ing következtében izzag támad, mellynek kiütésén némely orvosok örö vén, felkiáltnak: eeee crisis salutaris! pedig nem egyéb, mint ing által előhozott izzag, tehát nem üdvös bírálat. Kórgerjesztő ok t vábbá az izzadság is, kivált ha ez igen nagy mértékben 's esipős természetű lévén, hosszabb ideig marad a' bőr felületével érintkezésben illykor viz-izzegek Hydroa, Psydraeia acuta hydro Fu ehs. (Fror. T. 29. Behr T. 6. f. 3.) képeztetnek, mellyek kiesiny, apró, átlátszó, fehér, nem savanyú folyadékkal telt, vörös viszkető alapon ülő hólyagesák, tehát nem más, mint az izzadság es pössége által okozott izzag. Ezeken kívül még a' hőség rendtelenségei is okul vétetnek, melly felett azonban elhatározó ítéletet hoz nem szándokunk 's nem akarjuk megvitatni, valyon a' hőség rendtelenségei az izzagnak oka vagy következése é? Gyakran sem kórokat sem találhatunk fel; felnöttek 's kiesinyek, sőt eseesemők meglepetnek e' bajtól, úgyszinte görvélysenyvesek, senyvteleue férfiak, nők, kivétel nélkül. A' fiatal kornak a' pörseges, az éret nek inkább a' vörös izzagra van hajlama.

Az izzag lényege izzadmány-képződésben 's ennek mind a' ti szókben, mind az albőrben történő lerakodásában áll. A' tüszőkbe lerakodott izzadmány hólyagesákat vagy pörsegeket képez, az albőrben ennek megvastagodását okozza.

Ragályossága nem valószínű, ámbár Bielt, Rayer 's Levain oly példákat hoznak fel, melyek erre gyanút támasztanak. Az egyik izzagtól meglepett láb, ha a' másakra tételik, itt ugyanazon bőrszenv hozatik elő; de ezt csak a' folyadék csipősségének, nem pedig ragályosságának tulajdonítjuk.

A' joslát elég kedvező, mivel oly szer birtokában vagyunk, mely azt mindig meggyógyítja; kivéve azon eseteket, hol a' baj igen elterülve vagy elhanyagolva van vagy fonákul orvosoltatott.

Gyógymód. Elmellőzve azon különféle 's gyakran ellentétes gyógymódokat, melyeket sok bőrszenvgyógyászok ajánlanak: csupán azon gyógymódot említjük meg, mely elég biztos e' különmemű baj elmellőzésére 's ezen Dr. Hebra által Bécsben sok esetekben igen jó sikerrel használt 's legelőbb behozott gyógymód a' hideg borogatások vagy zuhany 's az égető hamag alkalmazatában áll. (Hol a' hideg borogatások alkalmazata nehézségekkel — mint gyenge kisdedeknél — jár, a' nagy nedvezés kigyó tarjag — lycopodium — vagy édes gyökér por behintése által legkönnyebben gátoltatik.) — A' képzett izzadmányt feloldani 's az új kiizadást meggátolni: a' két fő javallat; ezt a' beszűrődmény fokához képest majd csupán hideg borogatások és zuhanyok, majd ezeken kívül az égető hamag olvadéka alkalmazata által eszközöljük. Miután t. i. a' pikelyek 's pörkök a' hideg borogatások által eltávolítattak, a' szenvedő rész (10 perczig) megzuhanyoztatik vagy pedig hideg borogatások alkalmaztatnak; 's ha erre a' bőr beszűrődése nem törölletik el: úgy az égető hamagot használjuk illy vényben: R p. Kali caust. dr. duas solve in aq. d. s. unc. semis; ezen olvadék a' szenvedő bőrrészre tépet-ecset által alkalmaztatik. Mihelyt ez történik, a' bántódott rész felületén nedv választatik el, mi nem egyéb, mint haj 's fehérszál, mivel a' tömény fojtósav által megalszik — azért is a' gyógyulás csupán a' szapanosítás folyamának — t. i. a' báznak a' hamaggali egybeköttetése által — tulajdonítatik. Ezután a' hideg borogatások ismét folytattatnak, míg az edzés foganatai eltűnnek, mi a' különféle egyéneknél 6 — 21 nap után történik. Az első edzés mindig több eredménnyel koronáztatik, mint a' későbbiek. Az égető hamag mindaddig használtatik, míg az egész beszűrődés eltűnt, de tovább nem, különben a' baj súlyosbodik. A' hátramaradt vörösség a' horgany keverékes használata alatt törletik el. Ha az izzag oly helyen ül, hol az

edzés után dörzsölés használtathatik, akkor kezeltessék; ha az ábraton ül, ekkor az olvadék töményebbé készítettessék (2 nehezegető hamag 2 neh. lepárolt vízre). Azonban itt jól vigyázzunk, ne hogy az ecset szerfeletti megnedvesítése által az erről könnyen történhető lecsepegésre 's ez által az egészséges részek bőrkievődése alkalmat adjunk. Megemlítésre méltó, miszerint a' horgany kenő az egyszerű izzagnál, valamint a' kórfolyam bevégeztésénél, ugy ennek kezdetével sikerrel használtatik, kivált a' hideg borogatásokkal egyesítve.

Rüh.

Scabies. Scabies et Psora Fuchs. (Bat. T. 24. f. 1. 2. E' baj történetét *) olvasván, nem csodálkozhatunk eléggé, miké szolgálhatott okul ezen kóralak — mellyről évszázadok óta ann jeles iraték — olly sokszerű tévedésekre, hogy nem lehetett ezt legujabb ideig teljes bizonyossággal megösmerni, ugy, hogy még most is vannak gyakornokok, kik a' különféle pörseges, bubornyos 's hólyagesás bajokat e' névvel keresztelik. Ez a' másik menköpen, mellyel némelly bőrszenvorvosok járatlanságukat burkolják.

Tagadhatlan, hogy minden az életművezetet meglepő kór, bizonyos, kizárólagos, mintegy egyénies kórjelekkel külekszik: szükségkép ez a' rühhel is közös; de ha tekintjük, hogy az illy különféle 's nagy számmal előadott egészen más bőrbajokhoz tartozó kórjelek tévedésből a' rühre ruháztatnak: csoda-e, hogyha kivált keze orvos külgyakorlatában rühhel találkozáván, azt félreismeri, 's különféle bőrbajokkal összezavarja? Mi leginkább történik vagy a' bubornyás bőrbajokkal, mint a' mohaggal, viszketeggel, ha e' küte bubornyás alakban tűnik fel; — vagy pörseges bőrbajokkal, mint boborcsó vagy bincsó pörseggel, ha pörseg alakban lép fel; — vagy sömöreggel, ha hólyagesás alakban mutatkozik. Itt ugyanazon elvetetést lehetne tenni, hogy a' baj ragályossága 's lefolyása helye kórismére elég biztosan vezetnek, de kérdjük: ki fogja az előbben magán megkísérteni minden egyes esetben, 's várjunk-e hónapokig

*) Alibert Monogr. der Dermat. II. kötet 392. lap 's Oesterreich. Jahrbüch Märzheft. 1844.

hogy a' lefolyásra kórismét alapítsunk? Hogyan ismerjük meg tehát a' rühet bizton minden esetben? A' rüh egyedül csak akkor van jelen, midőn a' rühatka menetekre és magára a' rühatkára találunk, 's ezt bemutathatjuk. E' nélkül rüh nem létezik, ez először van jelen, ez tételezi fel a' legkülönneműbb bőrkiütéseket; melyek azonban különféle okok miatt módosíthatnak; azért azok nem állandó a' kórisme megalapítására szolgáló, hanem csupán lassanként kifejlődő 's a' rüh folyamához tartozó kórtünetek. Melly tünetek szerint azt kívánjuk értetni: hogy a' rühnek egyedüli jellemző kórjele az atkamenetek 's az ezekben létező rühatka; azért szükségesnek tartjuk mind a' menetek, mind az atka helyes ismeretét itt megemlíteni. — Az atkamenet a' kór tartásához, a' beteg korához, foglalkozásához 's a' bőr minőségéhez képest különféleképp mutatkozik. A' menet kevéssé kigyózdó hosszabb vagy rövidebb vonalból áll, melly a' bőr felületén kissé fel van emelkedve; a' vonal egyik vége a' jelenlévő hólyagcsába, bubornyába vagy pörsebbe, másika sötétebb színű bütyköeskébe (atka tanya) végződik. Ezen vonal különféle színezetű, fehér, vörös, sárga, zöld, fekete 'stb. valamint az egyén különféle színű mázanyaggal foglaltoskodik. Azonban találatnak olly menetek is, melyek magánosan a' fentebb említett bőrkiütések nélkül előjönnek. Az alkamenetek, valamint a' rühatkák is állandóan a' kezeken 's lábakon jönnek elő, azonban csupán a' kéz- 's lábtőig terjednek, a' helybeliség gyakoriságára nézve következik a' mony, igen ritkán száz eset közül két-tőben más helyeken ered. Ha tehát az állatkák jelenlétéről akarunk meggyőződni: úgy az említett helyeken a' menet egyik végét oltó tő vagy gerely segedelmével felhasítjuk, 's a' benne tanyázó atkát — melly mintegy fekete pont mutatkozik — az eszköz hegyével kiemeljük, mi annál könnyebben megtörténik, mivel a' sok hosszú sörtökkel ellátott állatka igen könnyen a' műszerhez tapad. Egyébként az állatfogás könnyebb annak éltében, mint élte után és azért az utolsó esetben nagy ügyesség kívántatik ahoz, hogy azt megfogjuk. Szabad szemmel tekintvén mint kicsiny vörös fehér pont tűnik fel, melly egy üvegtáblára alkalmazva igen gyors mozgást küöl. Górcső alatt az atka teknős békához hasonlít, teste majdnem tojásdad, barnás színű, háta több fogas felemelkedésekkel, keresztbefutó, hajtott, párhuzamos csikokkal ellátva; lába nyolcz, melyek a' hasfelén

erednek 's tövükön hagymaalakú hüvelylyel bevonvák; a' négy hasók nagy sörtekbe, az első szópónemű alakba — mellyek a' lólá hoz igen hasonlítanak — végződnek; azonkívül van egy szópónemű 's 6 sörtekkel ellátott fejük. *) Ha az atka 's menetek jelenléte bizonyult: úgy a' rüh kórisméje meghatározott, 's ámbár ez elbizonyosságot nyújt e' baj ismeretére, mi mégis e' kórfolyamat teljesen leirandjuk.

Miután hosszabb vagy rövidebb ideig, kivált az ágyymelegben, beteget igen kínzó viszketés gyötrötte volna, a' lábakon vagy kezeken néhány kicsiny felemelkedések — bubornyák — mutatkoznak; ezek szétvakartatván egy csepp vérrel vegyes folyadékot ömlesztnek ki, melly fekete pörkké szárad. Máskor az említett helyeken ködös idomú, átlátszó folyadékkal tölt hólyagesa mutatkozik, mellynek benéke később megzavarosodván, pörseggé alakul át: illy hasonlatos kiütések nem sokára az egész testen kivált a' végtagoknak hajtófeleletein, ritkán a' háton mutatkoznak. Ezek a' rühnek az elsőrendű tünetei.

Az atka szünetnélküli furkálása által, kivált meleg ágyban (mivel a' meleg által az atka új megúj lelkesedést nyer) okoztatott folytonos 's szüntelen öregbülő viszketés a' beteget vakaródzásra készteti, 's ez által az előbb jellemző bubornyák, hólyagesák, pörsegek pörökké változnak; továbbá még gumócsok is, különösen olyan helyeken, hol a' nyomás folytonos, mint az ültájon, támadnak; ezek új vakaródzásra okul szolgálván, új gumócsok létrehozását következtetik, mellyek összefolyván, megvastagodott 's elgenyedvén, pörkké fedett bőrrészt képeznek, mint ezt az alpfokon tapasztalhatni. — A' bajnak legfőbb fokában végre az egész test a' felül megírt tünetek kívül, különféle boboresó és bincsó pörsegekkel 's a' vakarás által létrehozott fekete, zöld és barna pörökkel fedetik. Továbbá a' boboresó vagy bincsó pörsegből támadt gumócsok az ültáján 's fekélyek a' végtagokon, pörökkel fedve tapasztaltatnak.

A' fentebb említettekből tehát kiviláglik:

*) Lerajzolásait lásd Oester. Jahrb. Märzheft 1844. — Raspail nouveau syst. de chimie organique, fondé sur des nouvelles methodes d' observation etc. Bruxelles 1840. T. 15. f. 1. 2. Fror. T. 42. f. 1. 2. Behr. T. 7. f. 12.

a) Hogy csupán az atka által feltételezett rüh létezik, a' többi: az igazi, ál, hólyagesás, binesós, görvély — vagy bujakóros 'stb. nem léteznek; mivel e' nevezetek vagy csupán rémképek vagy egyes tünetekből vagy időszakokból vétettek.

b) Azon különféle bőrkiütések, mellyek a' rühel összejönnek, mint bőrrepedések, pörkök, esomók 's fekélyek esupán, a' vakaródzás által hozatnak létre.

Kórok. Némelly orvosoktól rühkórokúl a' rüh betvegy (discrasia psorica) vétetik, másoktól a' ragály. Hogy a' rüheseknél nines vérbetvegy, következő okok bizonyítják:

1) A' rüh a' legegészségesebb egyéneknél is előjön.

2) A' tulajdonszerű küllem később a' baj hosszabb tartása után fejlődik ki.

3) Kóráttételek nem tapasztaltatnak, habár erről a' legujabb könyvekben is annyi íratik; hogy ezek nem léteznek Dr. Hebra 5500 rüheseknél eléggé bebizonyítá.

4) Mivel azon különnemű kütég alakok nem a' rüh általánoságából, hanem esupán rokonszenvből támadnak. *) Ha tehát rühbetvegy nem létezik, a' rüh esupán ragály által támad. De ez nem a' beteg kigőzölgése által 's nem a' binesó (vagy hólyagesa bennék átvitele által közöltetik egy egyénről a' másakra, mivel e' bennék többektől 's mi általunk is beoltatván, rühet nem hoza létre. Ha a' beteg bőrkigőzölgése vagy a' binesó 's hólyagesa bennék a' ragály közege volna: akkor a' rühes mindenkori érintésénél, kivált nyáron, átvitetnék a' ragály anyag; holott Dr. Spáth némelly rühesről 2—4 atkát kiszedvén, e' műtéttel sokszor félóraig is bibelődött a' nélkül, hogy e' nemű anyag által a' ragálytól meglepetett volna, megemlítvén azon kívül azt is: hogy ő száz meg száz rüheseket fogott kezébe, 's vizsgálgatá. Azon kérdés támad tehát: hogyan történik a' rüh átvitele egy egyénről a' másakra? ez az atka átvitele által történik, az atka t. i. vagy a' folytonos vakaródzása által szabadtatik meg az atkamenetből, 's így vagy az atka megy át vagy pedig érintkezés által történik a' fertezés; vagy az atka kifúrja magát menetéből 's a' ruhaneműkre vagy más tárgyakhoz erősen tapad, melyek érintése által az átvitel történik.

*) Hebra über die Krätze. Oester. Jahrb. 1844. Märzheft.

Hogy a' rüh csupán atka által tételeztetik fel, a' beoltás, mely sok orvosok által kezeltetett, bizonyítja; azonban itt azt mondhanák, hogy az atka nincs egészen megtisztítva a' rühanyagtól 's a' rühragályanyag az atkával is átvitetik 's ez által rüh támad. Ezen igen erős állítmány a' tapasztalattal ellenkezik, mivel Livorno lakosai 's a' Corsicai gályarabok a' rüh gyógyítását csupán az által kezelik, miszerint az atkát menetökből kiszedegetvén, azt elpusztítják; a' mint ez több hiteles orvosok írásaiból kiviláglik. A' rühnél tehát az atka mindig legkorábbi tényező 's ő egyedül a' rühnek feltételező alanya.

A' jóslat a' rühnél mindig kedvező, mivel mindig 's minden körülmények között meggyógyítható. Hogy semmi kóráttelektől nincs mit félnünk, feljebb említünk.

G y ó g y m ó d. Azon számtalan 's többektől igen eldicsért szerkek közül csupán hármat említünk meg: u. m. a' Wilkinsohnféle író az égető hamagot 's a' kettediblas higanyt; mivel a' többi ugyanazt, i. e. az atka elvesztését 's ez által a' rüh gyógyítását eszközözi. A' legkönnyebb rühgyógyítási mód a' következő: miután a' beteg megfürdöttük, szigorú vizsgálatot teszünk, ha van-e atka jelen, 's ha van, hol? 's mivel ezek többnyire a' kezekben 's lábakon jönnek elő, a' kezét a' kéztő, a' lábakat a' lábtő fölébe reggel 's este a' módosított Wilkinsohnféle kenőccsel *) bekenjük. Mindjárt az első kenésnél a' beteg ágyba fektetik, 's a' bekenés három nap eszközöltetik; ekkor a' beteg megfürdik; a' hatodik bekenéssel a' gyógyítás bevégeződött, ekkor ismét megfürdik 's mint egészséges a' további gyógyítástól felmentetik. De mivel e' kenőcs igen rossz szaga: ennek elkerülése végett magánygyakorlatnál az égető hamagot **) vagy a' kettediblas higanyt ***) használhatjuk, mely utóbbi kórodánkban is Prof. Sauer alatt koronázott sikerrel használtatik. Hátán a' bekenés következtében izzag képződött volna, úgy fürdőt használ-

*) Terrae cretosae unc. 4. Sulfur. venal. Picis liq. aa. unc. 6. Sap. domest. Ax. p. rec. aa. libr. j.

**) R. Kali caust. unc. unam Ax. p. unc. duas. M. D.

***) R. Deutojod. hydr. scrup. semis Ung. sim. unc. duus. M. Ezen író este kenetk be, reggel a' beteg szapanos fürdőbe tétetik. E' gyógymód által a' kűteg 8—10 nap alatt gyógyítatik meg.

nálunk vagy a' következő irt: R. Oxydi Zinci dr. j. Ax. uuc. unam. Az alpfok közt hátramaradó csomók elosztására legjobban használtatnak az égető hamag olvadékával. Rp. Kali caust. dr. 1. Aq. d. s. libr. j. való edzések. Hogy a' ruhaneműkhöz tapadt atkák általi ragályoztatást meggátoljuk: szükség ezeket vagy kénneli füstölésnek vagy nagy hőmérséknek (40—60° R.) kitenni.

V. Osztály. Bugyok (Bullae).

E' bajok felett igen nagy véleménykülönbség uralkodik, annyira, hogy több ez osztályhoz tartozó bajok majd itt, majd a' bincsök nemében iratnak le. Így a' gamatag Willan által a' bincsök között a' bincsó pörseg alatt iratik le; e' két bajt Plumbe is ugyanazonosnak tartja, sőt bincsópörsegből gamatagot láta kifejlődni. Ellenben Bateman ezeket elválasztja 's a' gamatagot a' bugyok alatt írja le, mellynek három fajtát különböztetvén meg. Alibert szinte, a' mit Willan bincsópörsegnek nevez, buboragnak nevezi.

Mi Cazenave, Schedel, Thomson, Rayer 's Fuchs után a' gamatagot itt adandjuk elő, mellyhez még a' buborag és a' buborékküteg számíthatnak.

Gamatag.

Gamatauy. Rupia Bat. Rhypia. Ecthyma Will. Pemphigus vagy Phlyzacia chronica Alib. Három fajtát különböztetjük meg:

a) Egyszerű g. R simplex. Rhypia vulgaris Fuchs (Bat. T. 53. Fror. T. 28. f. 1. Behr. T. 5. f. 8.) Itt az átlátszó folyadékkal telt hólyag sötétvörös bőrfolton támad, mellynek bennéke csak hamar megzavarosodik 's genyes küllemet ölt magára; ez megszáradván, barnás 's szentes kékes udvarral körülírt pörkké alakszik. Ha néhány nap múlva a' pörk eltávolítatik: felületes fekély tűnik elő, melly egy ujonnan képződött pörk alatt beheged vagy nagyobb genyelválasztással párosul 's mélyebbre terjed; a' fekély ismét új pörkkel fedetik be, a' pörk újra eltaszítatik 's ezen folyam néhányszor

történik, míg végre a' genyelveasztás 's így az egész kórfolyan bevégeződik. A' megkeményedett esokoládé színű pörk leesvén, szes kékes hegjeggy marad hántra.

b) Kiálló g. R. prominens Bat. Lepas Piutti (Bat. T. 54. Fror. T. 28. f. 2. Behr T. 5. f. 9.) Kezdeté éppen ollyan mint az előbbinek, csupán kisebb hólyagokkal ered; miután az első pörk képződött, ez nem távolítatik el, hanem az elválasztott anya alatta meggyülemlik 's a' pörk szélén hólyagokat képez, mellye közepéből a' pörk tűnik ki; ezek az első pörköt felemelik 's szint pörkké alakulnak át; melly folyam többször ismételtetvén, ezen kúpidomú pörköt képzik. E' kóralaknál tehát jellemző a' hólyaggyűr vagy e' helyett a' felbőr karimától körülírt kúpidomú pörk. Ha a' va leesik, fekély mutatkozik, melly ujonnan, de már többé nem kúpidomúval, hanem lapossal, sőt olykor közepében behorpadt pörkkel fedetik 's ez által a' régiek úgynevezett pörkös fekélye (ulcer crustosum) képződik.

E' két faj tanyája a' végtagok; azonban más test részein is előjöhetnek, kivált az orszárnyakon, hol ezek a' pof lágy részeire mennek át 's szarv idomát öltik magokra, 's ez többnyire bujakóros eredetű. Lefolyásuk idült 's többszöri kiütésekkel járnak.

c) Pörkös g. R. escharotica Bat. Paedophlysia escharotica Fuchs Pemphigus infantilis s. neonatorum auctorum. Előrement nyugtalanság, álmatlanság 's nagy lázas kórjelek után a' bőr különféle részein igen égető fájdalmakka szenykes kékes foltok támadnak, mellyeken tüstént vérrel vegyes folyadékot rejtő hólyagok támadnak; ezek bennéke kifolyván, a' körülfekvő részeket xirágja, mi által kékes szenykes felemelkedett karimákkal ellátott mély fekélyek támadnak, mellyek az elválasztott ev által képzett pépösszeállású pörkökkel fedetnek be; ezek alatt a' részek pusztítása folytonosan történik. Fuchs szerint az elválasztot evnek hugy szaga van 's savany vizsgálást különnek, mellyet ő a' hugy rendetlen elválasztásától származtat; ezen véleményben Osiander, Lobstein 's Kraus is megegyeznek. A' különféle testrészeken szakonként több új hólyagok képződnek, mellyek ugyan-

azon lefolyásuak, mint az előbbie. A' baj nagyobb kiterjedésénél a' szájban zsebrék 's nagy hasmenés támadnak, a' láz 's fájdalmak nöftön nőnek 's a' szenvedő kisdedek 8 — 12 nap alatt sorvasztó tü-nemények alatt elvesznek. A' gyógyulás soha sem történik hátrama-radt rút hegjegyek nélkül.

K ó r o k. A' gamatag alakai legtöbbszörre görvély 's angolkóros egyéneknek jönnek elő; ezenkívül gyakran tapasztaltatik gyermekek-nél 's megnötteknél az alsóbb néposztálynál, kik rossz táp- 's szennyel küzködnek és sok égettort isznak. A' pörkös faja e' bajnak csupán kisdedeket — a' szüléstől az első fogzásig — lep meg, 's a' fenem-lített körülmények között megnötteknél is előjön, 's tapasztalatból ki-indulva állítjuk: hogy a' bujakóros szüléktől származott gyermekek-nél gyakori.

A' jó s l a t a' beteg alkotmányától, a' kórvegy kiképzési foká-tól függ; az első két fajnál majd mindig kedvező, a' harmadiknál többszörre kedvezetlen.

G y ó g y m ó d. Az első két fajnál csupán lágyító fürdő 's tisz-ság ajánlatik, tápláló étrenddel, — 's ezek a' kórfolyamot többszörre kimerítik. Ha azonban a' testben valamely kórszuny léteznék, ez ellen is szükség működnünk. A' harmadik fajnál, belsőleg az első utak savanyúsága miatt magnesia 's rheum kis adagban; helybelileg a' részek tisztogatása, lágyító 's bódár főzetekkel langyos mosások, a' *Trusen* gyógymodora (lásd az égetéseket pag. 37.) a' pokolko-olvadéka 's a' t, mint a' bőrpállásnál, foganatosak.

Buborag.

Bugyogany. Pemphigus. A' buborag lázzal párosult, hólyagokkal jellemzett és nem ragályos bőrbaj. Már a' szivárvány sömöregnél megjegyzők, hogy igen kétes, vallyon létez-e heveny bu-borag; mivel ez a' szivárvány sömöreggel igen gyakran felcserélte-tik 's csupán a' legnagyobb ritkaságokhoz tartozik. Megkülönbözte-tünk heveny 's idült buboragot, az elsőtt itt irandjuk le, a' másikat

a' buborékküteggel alatt tárgyalandjuk. Következő négy időszakot különböztetünk meg: az első időszak: miután néhány napig látni tünetek, undor 's hányás 's a' t. előrement volna; a' második időszakban, többnyire a' harmadik napon különösen a' száj körül vörös foltok tűnnek elő, ezeken előbb kicsiny felemelkedések, később mogyorónagy, sőt nagyobb hólyagok jönnek elő vörös udvarral körülvérvák, a' hólyagok átlátszó savóval vannak megtelve, — 's míg történik, más részeken szinte foltok támadnak, melyeken később ismét hólyagok képződnek, úgy, hogy a' később megjelenő küteggel mindig egy időszakkal hátrább állanak 's e' folyam 5 — 6 napig tart, melly idő alatt a' hólyagok kiképződési legfőbb fokukat elérték 's által a' harmadik időszak is bevégeződik. Végre a' hólyagok megrepednek, bennékök kiürül, tömlőjük összezsugorodik 's pikkelyeket képez; vagy a' hólyag bennék megszárad 's pörkké lesz. Kétféleképpen itt ritkán történik. Mások e' helyen még a' csecsemősből boragot is előhozzák, mellyet azonban mi ugyanazanosság végett pörkös gamatagnál tárgyalunk.

Kórok. Ezt többnyire nem tudjuk. Sokszor csorvás tünetekkel párosul, azonban hogy ez kórgerjesztő okbéli viszonyban áll-e a' buboraggal vagy csupán szöveményes baj, eldönteni nem feltételünk. Raimann nézete szerint köszvényeseknél jön elő, a' húdélválasztás megkevesebült; ez Fuchs észleletével is megegyez, ki e' bajt a' megzavart húdélválasztástól származtatja 's az az Uroplanien nemű kütegeknél írja le. Prof. Sauer ezt egy 17 éves leánynál tapasztalá, kinél a' havi tisztulás még be sem kezdőszönt 's kinél a' vérköb 's e' baj egymást felválták, miután a' havi szám beállott, e' tünetmények elmaradtak.

Gyógymód. Az egyszerűnél semmit tenni legjobb, a' köszvényeseknél a' húdkiválasztást kell előmozdítani — a' havi tisztulás rendtelenségeknél vagy kimaradásnál, ezeket kormányzani vagy lehozni szükséges.

Buborékküteggel.

Hólyagany. Pompholix. E' bőrbaj az előbbenitől az által különbözik, hogy legtöbbször láz nélkül jelen meg 's gyakoribb k

fekélyzéseknek van alávetve. Dr. Hebra egy esetben e' kór-
nemmel lázat is látott párosulni. Vörös, egész lencsenagy foltokon csu-
pán a' felbörképezte hólyagok támadnak, a' hólyag megpattan 's az
ebből kiömlött folyadék a' fehérenemükön olly foltokat képez, mint ez
az izzagnál tapasztaljuk, részint pedig pörkökké változik át, mellyek
alatt nem ritkán kifekélyzések történnek. Ha e' baj tovább tart vagy
az egész bőrfelületen elterjedt, a' nagy nedvvesztés miatt gyen-
geség, senyves küllem 's a' t. fejlődik ki 's nem ritkán a' halál kö-
szönt be.

A' buborag 's buborékküteg közötti különbség a' következő:

Buborag.

Buborékküteg.

Láz előzi meg.	Nem.
A' hólyag vörös udvarral van kö- rülveve.	Vörös udvar nincs jelen.
Többnyire az arczon jön elő.	Más részeken,
A' hólyag bennék viszhatása kö- zönbös.	Savanyús.
Rövid lefolyású.	Hosszú lefolyású,
Kifekélyzés ritkán vagy soha sem tapasztaltatik.	Majd mindig.

Három faját különböztetjük meg:

a.) Ártatlan b. P. benignus. Lencse egész diónagy hó-
lyagokkal jellemeztetik, az arczon, nyakon 's végtagokon jön elő;
a' folyam bevégződése után barnás folt több ideig látszik.

b.) Huzamos b. P. diutinus. Ez az általánosan leírt folya-
mot követi.

c.) Magános b. P. solitarius. Többnyire asszonyoknál
jön elő; az alfofokon galambtojásnagy hólyag képződik, melly meg-
pattanván, a' kórfolyam bevégződött.

E' bajnak kórokát Fuchs szinte a' hügyelválasztás rendet-
lenségében keresi 's ezzel Prof. Sauer által tett tapasztalatok is
megegyeznek. Kórjelesleg senyves küllemü egyéneknél, mint sü-

lyüsöknél, vízkórban 's hagymázban jön elő. A' kórtámasztó ok többnyire az első utak csorvás állapota.

A' jóslat függ az egyéniségtől, kórokoktól, kivált ha csupán mint kórjeles bántalom lép fel.

G y ó g y m ó d. Ennél mindig a' kórokoktól kell javallatot venni ha a' baj a' hudelválasztás rendetlenségének oka, úgy hudhajtól csorvás állapotnál hánytató vagy hashajtók vannak javalva. Senyves egyeniség mellett erősítő, mint: kinahéj, iblanyos vas 's tápláló étrend rendeltetnek. A' kórjeleseknél az eredeti baj ellen ke-
működnünk. —

T h e s e s :

1. Strophulus merito Lichen parvulorum nominatur.
2. In Prurigine nullam agnoscimus dyscrasiam.
3. Psoriasis pistorum est Eczema.
4. Lepra Willani non aliud ac Psoriasis orbicularis.
5. Lepra nigricans non est naturae siphiliticae.
- 6 Eczema pro malo universali haberi non potest.
7. Scabies solum unica existit.
8. Metastases a suppressa scabie ortae phantasiae figmenta.
9. Pemphigus infantilis et Rupia escharotica unum idemque.

